

LORLATINIB

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	3
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	5

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Lorlatinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Lorlatinib remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een specifieke stof in sommige kankercellen.

Lorlatinib is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam:.....

02 INNAME

Neem elke dag **1 tablet van 100mg** in met een glas water, **met of zonder eten**. Het is belangrijk om dit elke dag op hetzelfde tijdstip te doen.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms kan het voorvallen dat dosisverlaging of tijdelijke therapiestop noodzakelijk is omdat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. Dit gebeurt steeds in overleg met de behandelende arts.

03 PLETTEN / BREKEN

Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water, zonder te kauwen. U mag de tabletten **NIET** breken, **NIET** pletten en **NIET** oplossen.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met lorlatinib start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van lorlatinib verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Uw thuismedicatie zal bevestigd worden door een medewerker van de ziekenhuisapotheek, eventueel telefonisch. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

- Vooraleer u de behandeling met Lorlatinib start, zal er een bloedafname en hartonderzoek via EKG (electrocardiogram) gebeuren.
- Drink geen pompelmoessap of eet geen pompelmoes tijdens uw behandeling met lorlatinib. De hoeveelheid lorlatinib in uw lichaam kan hierdoor namelijk veranderen.
- Gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid, dit kan de werking van lorlatinib nadelig beïnvloeden.
- De doeltreffendheid van de pil tijdens behandeling met lorlatinib is onzeker. Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 35 dagen (vrouwen) of 14 weken (mannen) na de behandeling met lorlatinib. Bespreek met uw arts wat de beste anticonceptiemethoden voor u en uw partner zijn.
- Geef geen borstvoeding tijdens en tot 7 dagen na de behandeling met lorlatinib, dit kan de groei en ontwikkeling van de baby beïnvloeden.
- Lorlatinib kan bij sommige patiënten een effect hebben op het centraal zenuwstelsel (verwardheid, vermoeidheid). Voorzichtigheid is geboden bij het autorijden of bedienen van machines.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

- Als u vergeet om lorlatinib in te nemen op het juiste tijdstip, neem dan de gebruikelijke dosis in van zodra u er aan denkt, indien er minstens 4 uur tijdsverschil is met de volgende geplande inname. Indien uw volgende inname moet gebeuren binnen de 4 uur, dan dient u de vergeten dosis achterwege te laten.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Indien u heeft gebraakt na inname van lorlatinib, neem dan geen extra dosis in maar neem uw volgende dosis in op het normale tijdstip.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- Verhoogde cholesterol- en lipidenwaarden in het bloed;
- Cognitieve stoornissen: veranderingen in denken en spraak;
- Stemningswisselingen;
- Vochtretentie en oedemen;
- Vermoeidheid;
- Hoofdpijn;
- Gewichtstoename;
- Obstipatie, diarree en misselijkheid;
- Huiduitslag;
- Langzame of onregelmatige hartslag;
- Perifere neuropathie (spierzwakte, veranderend gevoel in handen en voeten);
- Gewrichtspijn en spierpijn.

Telefoonnummer verpleegkundig consulent: +32 9 332 07 99.

08 BEWARING

Lorlatinib moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen. Breng overgebleven medicatie terug naar de ziekenhuisapothek, spoel deze zeker niet door via het toilet of de lavabo.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapothek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Lorlatinib wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapothek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 12.30u-16.30u
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapothek: +32 9 332 32 41

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.