

Reumatologie

Ingang 74, route 740
T +32 (0)9 332 22 52

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



AZATHIOPRINE

IMURAN®



AZATHIOPRINE

Uw arts schreef azathioprine (Imuran®) voor. Dit medicijn wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van verschillende reumatische aandoeningen.

Werking

Azathioprine (Imuran®) behoort tot de basistherapieën bij reumatische aandoeningen. Het werkt in op het afweersysteem en remt de ontstekingen. Daardoor nemen de pijn en ontstekingen af en is er minder kans op orgaanbeschadiging.

Azathioprine (Imuran®) heeft effect ongeveer 4-10 weken na de opstart van het medicijn. Eventueel schrijft uw arts een ander medicijn voor om deze periode te overbruggen.

Inname

Afhankelijk van de dosering neemt u Azathioprine (Imuran®) één of twee keer per dag. Uw arts bespreekt met u welke dosering u moet gebruiken.

Opstart

- ▲ De arts beslist om Azathioprine (Imuran®) voor te schrijven.
- ▲ Uw arts geeft u een voorschrift mee om het geneesmiddel af te halen bij uw apotheek.
- ▲ Er is geen terugbetalingsattest nodig voor Azathioprine (Imuran®).
- ▲ U start met de inname van het geneesmiddel.
- ▲ De eerste 8 weken gaat u regelmatig naar uw huisarts voor een bloedafname ter controle van beenmerg-, lever-, nierfunctie en ontstekingsparameters.
- ▲ Na ongeveer 4-6 weken komt u op controle bij uw arts om de evolutie op te volgen.
- ▲ Ongeveer 12 weken na de opstart ondergaat u een tweede controlebloedafname. Nadien gebeurt dat elke drie maanden.

Aandachtspunten

Bespreek met uw arts of u Azathioprine mag innemen in een van de volgende situaties:

- ▲ Gelijktijdig gebruik van Allopurinol
- ▲ Ernstige infectie
- ▲ Ernstig gestoorde leverfunctie
- ▲ Ernstig gestoorde beenmergfunctie
- ▲ Pancreatitis (alvleesklierontsteking)
- ▲ Overgevoeligheid voor mercaptopurine

Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- ▲ Misselijkheid
- ▲ Opgeblazen gevoel
- ▲ Buikkrampen
- ▲ Diarree
- ▲ Haarverlies

Daarnaast gebeuren bloedcontroles ter opsporing van:

- ▲ Gestoorde levertesten
- ▲ Gestoorde beenmergfunctie

We raden aan om jaarlijks op consultatie te gaan bij de dermatoloog. Azathioprine zorgt voor een verhoogd risico op huidtumoren.

Vermoedt u een ernstige bijwerking, contacteer dan uw arts.

Vaccinatie

- ▲ Laat u terwijl u Azathioprine gebruikt niet vaccineren met een levend verzwakt vaccin, zoals mazelen, rubella, bof en gele koorts.
- ▲ Een influenza- en pneumokokkenvaccinatie is wel aanbevolen. Primovaccinatie: 1 dosis Prevenar 13, en minstens 8 weken later 1 dosis Pneumovax 23. Herhalingsinenting met Pneumovax 23 aanbevolen om de 5 jaar.

Voorzorgsmaatregelen bij onderhoudsbehandeling

Laat uw bloed de eerste maand wekelijks controleren en nadien om de drie maanden zolang u azathioprine (Imuran®) gebruikt. Zo kunnen we mogelijke schadelijke neveneffecten tijdig opmerken.