

HOE VERLOOPT DE IMMUNOTHERAPIE?

Hoe wordt pembrolizumab (Keytruda®) toegediend?

Pembrolizumab wordt steeds toegediend in het ziekenhuis met een infuus en dit om de 3 weken. Eens de behandeling werd opgestart krijgt u deze behandeling gewoonlijk zolang de ziekte onder controle blijft en u geen last heeft van ernstige bijwerkingen.

De dag zelf of de dag voor de therapie gebeurt er altijd een bloedafname. Dit bloedonderzoek kan eventueel ook door uw huisarts gedaan worden. Bespreek de mogelijkheden met de arts van de dagkliniek. Een bloedonderzoek is nodig om te sterke immuunreacties tijdig op te sporen. Men kijkt vooral naar de werking van de lever, naar de schildklier en eventueel naar andere organen. Pas als de bloedwaarden gekend zijn, wordt pembrolizumab besteld door de arts van de dagkliniek. Dat verklaart waarom er soms een wachttijd is voor men kan starten met de toediening.

De inlooptijd van pembrolizumab bedraagt ongeveer 90 minuten. Reken erop dat u voor het volledige verloop een voor- of namiddag kan doorbrengen in het ziekenhuis. Breng gerust iets mee om te lezen of een computer of tablet om u bezig te houden.



Praktische info

De behandeling vindt plaats op de dagkliniek Medische oncologie (ingang 50, route 612). Bij elke behandeling moet u zich eerst aanmelden aan de aanmeldzuilen (ingang 50, route 500-501). Na de inschrijving komt u naar de receptie van de afdeling. Daar geeft u de papieren af die u meekreeg.

U kan kiezen voor een één- of tweepersoonskamer. Als u kiest voor een eenpersoonskamer is het aangeraden om eerst na te gaan of uw hospitalisatieverzekering tussenkomt. Het is ook mogelijk dat er op dat moment geen eenpersoonskamer vrij is op de dagkliniek.

Als er geen complicaties waren tijdens de toediening, kan u na de toediening van pembrolizumab naar huis. Let wel dat u steeds een afspraak en een aanvraag voor bloedafname heeft voor de volgende behandeling. Wij raden aan om de eerste keer iemand mee te brengen, zodat u niet alleen naar huis hoeft te gaan. Op die manier kan u inschatten of het wenselijk is om voor de volgende keer iemand mee te brengen of niet.

Het pembrolizumab-schema

	Product	Vorm	Werking	Tijdstip of tijdsduur
1	Spoelvloeistof	Infuus	Spoelen leidingen	10 min.
2	Pembrolizumab	Infuus	Immunotherapie	30 min.
3	Spoelvloeistof	Infuus	Spoelen leidingen	10 min.
Het infuus wordt verwijderd				

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.