


TEBENTAFUSP/KIMMTRAK®

Tebentafusp is een **immunotherapie** die gebruikt wordt bij **HLA-A*02:01-positieve patiënten** met een niet-opereerbaar of uitgezaaid oogmelanoom. Ongeveer de helft van de mensen is HLA-A*02:01-positief. Het is een kenmerk van het immuunsysteem dat impact heeft op de tumor en dat bepaald wordt via een bloedtest.


De therapie

De therapie heeft als doel om de T-cellen van uw eigen immuunsysteem te activeren om tumorcellen te bestrijden.

Your immune system protects your body from foreign threats, like cancer, by activating T cells that can fight and kill these threats. Sometimes, T cells need help knowing which threats to attack.



KIMMTRAK is only appropriate for patients who test positive for the HLA-A*02:01 gene. **KIMMTRAK** attaches to the HLA-A*02:01/gp100 complex, a marker often found on uveal melanoma tumor cells.



This helps your body's T cells recognize, attack, and kill uveal melanoma tumor cells. Normal skin cells could also be targeted.

© www.kimmtrak.com

Meer info over immunotherapie vindt u op <https://immuno-t.inmotion.care>

Volg deze stappen:

- ▲ Kies voor 'patiënt'
- ▲ Doorloop de tekst en kies het type toestel waarop u de film wil bekijken
- ▲ Kies uw therapie
- ▲ Kies voor BiTes
- ▲ Bekijk de film

Toediening van Tebentafusp

Tebentafusp wordt **wekelijks via een infuus** toegediend.

De therapie kan vooral bij de eerste toedieningen intense bijwerkingen geven. Daarom nemen we u de eerste vier keer op in het ziekenhuis om de bijwerkingen te monitoren en op te vangen. Meestal hoeft u maar één nacht te blijven. Als de bijwerkingen onder controle zijn, kunt u terug naar huis.

We drijven de dosis keer per keer op tot we de gewenste dosis bereiken. We houden daarbij rekening met de bijwerkingen die u ervaart. U krijgt eventueel bijkomende medicatie om de bijwerkingen onder controle te krijgen.

Zodra uw lichaam aan de medicatie gewend is, verdwijnen de bijwerkingen of zijn ze goed te verdragen. We zetten de behandeling dan verder in het dagziekenhuis. Voor elke dagopname doen we een bloedafname.

De toediening van de therapie duurt 15 tot 20 minuten. Daarna blijft u nog een halfuur ter observatie.

Tussen de toedieningen plannen we onderzoeken om te bekijken of de therapie een goede werking heeft op de tumor.

Mogelijke bijwerkingen

Cytokinerelasesyndroom

Deze reactie van het lichaam op de immunotherapie treedt vooral de eerste 8 uur na de toediening op. De bijwerking kan ernstig zijn, daarom wordt u in het ziekenhuis opgenomen ter observatie.

Het cytokinerelasesyndroom uit zich door koorts, vermoeidheid, algemeen onwel gevoel, misselijkheid, braken, koude rillingen, lage bloeddruk, duizeligheid, hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag.

Deze reactie verwachten we vooral bij de eerste drie toedieningen en wordt beetje bij beetje milder. Indien nodig geeft de arts u tijdens de opname extra medicatie om de klachten te onderdrukken.

Huidreacties

U kunt last hebben van jeuk, zwelling, droge huid, roodheid en vervelling. Hydrateer uw huid goed met een vochtinbrengende crème tijdens de behandeling.

Gestoorde leverwaarden

We monitoren uw leverwaarden via bloedafnames voor de behandeling.



Meld bijwerkingen!

Hebt u thuis, tussen de behandelingen, last van bijwerkingen, neem dan contact op met het ziekenhuis:

- ▲ **An Bosschaert** (verpleegkundig consulent): tel. 09 332 05 35, an.bosschaert@uzgent.be
(bij afwezigheid staat de telefoon doorgeschakeld naar het Kankercentrum)
- ▲ **Dagziekenhuis oncologie**: tel. 09 332.26.91 (dagelijks van 8 tot 17 uur)
- ▲ **Verpleegafdeling oncologie**: tel. 09 332 31 64 (buiten de kantooruren en in het weekend)