

# UW BEHANDELING MET DASATINIB

---

KANKERCENTRUM



---

## WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE / INHOUD(SOPGAVE)

01	Inleiding	3
02	Hoe werkt dasatinib?	3
03	Inname van dasatinib	3
04	Pletten / breken	5
05	Bewaring	5
06	Bijwerkingen	5
07	Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid	16
08	Geneesmiddelen, dranken & producten op basis van kruiden of planten die niet gecombineerd mogen worden met dasatinib	16
09	Vaccinaties tijdens behandeling met dasatinib	20
10	Waar verkrijgbaar?	20

## 01 INLEIDING

Met deze infobrochure geven we u wat bijkomende informatie over uw behandeling. Verder geven we u enkele handige tips om bijwerkingen te vermijden of te behandelen en vermelden we wanneer u best de arts, de verpleegkundig consulent of de apotheker contacteert. Zij geven u graag meer uitleg, dus aarzel niet om hen te contacteren.

## 02 HOE WERKT DASATINIB?

Dasatinib is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om chronische myeloïde leukemie (CML) of een bepaalde vorm van acute lymfatische leukemie (Ph+ ALL) te behandelen. Het werkt doelgericht tegen een fout aanwezig in abnormale witte bloedcellen waardoor deze in aantal verminderen en de goede bloedcellen opnieuw kunnen groeien.

Dasatinib is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam: .....

Zo mogelijk wordt deze medicatie **NIET** ingewisseld voor andere merken met hetzelfde werkzame bestanddeel.

In principe is de behandeling van CML of Ph+ ALL levenslang, maar de duur van de behandeling met dasatinib hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling.

## 03 INNAME VAN DASATINIB

### Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Dosis + startdatum: .....
- De dosis is afhankelijk van uw ziekte en hoe u de behandeling verdraagt. Neem **1 maal per dag 1 tablet van 20 mg - 50 mg - 70 mg of 100 mg** of een combinatie: .....
- Neem dasatinib elke dag op hetzelfde tijdstip (mag **met of zonder voedsel**).
- Slik de tablet(ten) in hun geheel door, zonder pletten of kauwen, met een glas water.

Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen te ernstig zijn of het effect niet optimaal is. In dat geval kan de arts uw dosis verlagen, verhogen of de behandeling tijdelijk stoppen om uw lichaam de kans te geven

om te herstellen. Van zodra u bijwerkingen ervaart, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw arts, de oncologisch verpleegkundige of de ziekenhuisapotheker.



Wijzig de dosering of stop de behandeling nooit op eigen houtje! Neem steeds de dosering die uw arts heeft voorgeschreven.

## Belang van een juiste inname van uw medicatie

Het is belangrijk om dasatinib dagelijks in te nemen. Op die manier werkt het geneesmiddel constant tegen de abnormale witte bloedcellen met een optimale doeltreffendheid en slaagkans tot gevolg. Indien u dasatinib slechts af en toe zou innemen, krijgen de abnormale witte bloedcellen meer kans om opnieuw te groeien.

U zal wel eens een moment hebben waarop u denkt te willen stoppen met de behandeling, zeker wanneer bijwerkingen de kop opsteken. Maar, het is net heel erg belangrijk dat u volhoudt en verdergaat met deze behandeling.

## Wat doen als u een inname bent vergeten?

Bent u vergeten dit middel in te nemen:

- Neem uw dosis zo snel mogelijk in op dezelfde dag. Neem uw volgende dosis de volgende dag in op het gebruikelijke tijdstip.
- Neem nooit een dubbele dosis in op dezelfde dag om een vergeten dosis in te halen.

Meld een niet-ingenomen dosis steeds bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

Als u braakt nadat u dasatinib heeft ingenomen, neem dan geen extra dosis in. Neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

## Wat doen indien u te veel tabletten hebt ingenomen?

Als u per vergissing te veel dasatinib hebt ingenomen of iemand anders heeft uw tabletten ingenomen, neem dan steeds contact op met uw arts, de spoedafdeling van het ziekenhuis of het antigifcentrum (tel. 070 245 245) voor advies.

## 04 PLETTEN / BREKEN

U mag de tabletten NIET pletten, NIET breken of NIET oplossen.

Contacteer bij slikproblemen uw arts of ziekenhuisapotheker om andere toedieningsmogelijkheden te bespreken.



## 05 BEWARING

- Bewaar de medicatie op kamertemperatuur op een veilige plaats in de originele verpakking.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die terug te vinden is op de verpakking naast 'EXP'.

!

Indien u dasatinib niet meer moet gebruiken, of het geneesmiddel is vervallen, breng dan de overige tabletten naar uw arts of apotheker. Gooi ze niet in de vuilnisbak.

## 06 BIJWERKINGEN

Het is mogelijk dat er tijdens de behandeling bijwerkingen optreden. De intensiteit en aard van deze bijwerkingen verschilt van persoon tot persoon. Sommige personen hebben zeer veel ongemakken, andere hebben geen enkel.

Het is steeds belangrijk om uw arts, verpleegkundige of apotheker op de hoogte te brengen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Ze zullen u adviezen geven om de klachten te verminderen of te behandelen.

Wees niet ongerust indien u weinig nevenwerkingen ervaart. Dit betekent zeker niet dat de therapie onvoldoende of niet werkt.

### **Volgende bijwerkingen kan u ervaren:**

■ Vermoeidheid	6
■ Misselijkheid en braken	8
■ Diarree	9
■ Veranderingen ter hoogte van de huid	11
■ Vermindering van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes	12
■ Spierpijn	14
■ Hoofdpijn	14
■ Vochtophoping (oedemen)	15

## **Vermoeidheid**

Dit is een zeer vaak voorkomende bijwerking. Vermoeidheid wordt gekenmerkt door:

- u algemeen zwak voelen
- zware ledematen
- verminderde aandacht en concentratie
- niet goed slapen, een toegenomen slaapbehoefte
- geïrriteerd zijn
- belemmering bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten
- zware vermoeidheid na een inspanning
- u niet goed voelen in uw vel

Deze vermoeidheid kan een sterke impact hebben op uw dagelijkse activiteiten.

Met deze tips kan u toch de mogelijke ongemakken beperken.

### **TIPS**

- **Probeer uw normaal levenspatroon zoveel mogelijk te behouden.**
- **Plan uw activiteiten en verricht deze op uw eigen tempo; geef voorrang aan de activiteiten die werkelijk nodig zijn die dag en die u graag doet.**
- **Indien nodig, las korte rustpauzes in.**
- **Rust regelmatig een half uurtje i.p.v. echt te slapen overdag.**

- **Vraag zo nodig hulp aan vrienden en familie of schakel professionele thuiszorg in (dit kan via de sociale dienst).**
- **Zorg voor een evenwichtige voeding en drink voldoende.**
- **Maak korte wandelingen en doe lichte activiteiten, dit kan deugd doen.**
- **Maak voldoende tijd vrij voor ontspanning.**
- **Zorg voor een goede nachtrust, ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op.**
- **Indien u de slaap niet kan vatten, blijf dan niet in bed liggen. Sta op en ga iets drinken of doe kort iets ontspannend.**
- **Indien u moeilijk blijft slapen, bespreek dit zeker met uw arts of verpleegkundige. Zij zullen u trachten verder te helpen.**
- **In het ziekenhuis worden infonamiddagen omtrent vermoeidheid georganiseerd op geregelde tijdstippen. Infobrochures en nuttige tips kan u bekomen uw verpleegkundig consulent.**

---

#### LET OP

- **Als u zich ongewoon vermoeid voelt, wees dan voorzichtig wanneer u met de auto rijdt of machines bedient.**
- **Vermijd onnodige activiteiten, stress of spanningssituaties.**
- **Vermijd overmatig alcoholgebruik.**
- **Vermijd slapen overdag (zodat u voldoende moe bent voor het slapengaan).**
- **Vermijd stimulerende middelen (zoals cafeïnerijke dranken) voor het slapengaan.**

---

#### ! Wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis?

- **In bepaalde gevallen van ernstige vermoeidheid, zoals bv. in geval van kortademigheid bij een lichte inspanning.**

In het UZ Gent worden een vijftal keer per jaar vermoeidheidsessies georganiseerd voor patiënten en hun familie. Individueel kan u ook terecht bij de verpleegkundig consulent en de psychologen om u hierin verder te begeleiden.

U kan Mindfulness volgen. Ook deze vorm van therapie heeft reeds zijn nut aangetoond bij de aanpak van deze bijwerking. Voor meer informatie hierover kan u terecht op 09/332.54.08.

## Misselijkheid en braken

Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking. De intensiteit verschilt van persoon tot persoon. Deze misselijkheid kan leiden tot braakneigingen en braken.

Bij de meeste patiënten gaat het om een zwakke tot matige vorm van deze bijwerking. U kan last hebben van:

- minder eetlust
- een zwaar gevoel in de maag
- een opgeblazen gevoel
- een pijnlijke maag
- braakneigingen

De misselijkheid treedt meestal op tijdens een korte periode en dit vooral in de beginfase van de behandeling.

Het volgen van bepaalde voedingsregels kan u helpen bij deze bijwerking.

### TIPS

- **Eet kleine hoeveelheden, gespreid over de dag. Vermijd zware maaltijden.**
- **Eet voedsel dat u lekker vindt.**
- **Eet droog voedsel zoals granen en toast.**
- **Drink regelmatig water, maar drink kleine hoeveelheden zodat u geen opgeblazen gevoel hebt.**
- **Zorg ervoor dat u frisse lucht hebt.**
- **Spoel na het braken uw mond met koud water en wacht 1 tot 2 uur alvorens te eten.**
- **Als u misselijk bent, geef dan de voorkeur aan koude of lauwe voedingsmiddelen. Deze geven minder geur af dan warm voedsel.**
- **Vraag uw (huis)arts een geneesmiddel tegen misselijkheid of braken: bij voorkeur metoclopramide (Primperan®). Omwille van wisselwerking met dasatinib, is het gebruik van domperidone (Motilium®) minder aangewezen. Neem het anti-braakgeneesmiddel 30 minuten voor de maaltijd in of zoals voorgeschreven door uw arts. Indien u na de inname van de medicatie misselijk wordt, neemt u het anti-braakmiddel best 30 min voor de medicatie.**





## LET OP

- Vermijd sterke kruiden, te zoet, gebraden of vet voedsel (bv. gefrituurd voedsel).
- Vermijd drinken tijdens de maaltijd, dit neemt uw eetlust weg.
- Vermijd onmiddellijk te gaan liggen na de maaltijd, een halfzittende houding is beter.
- Als u misselijk bent, vermijd dan sterke geuren. Deze kunnen de misselijkheid verergeren.
- Vermijd alcoholische dranken.

### ! Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Als de misselijkheid of het braken leidt tot:

- Onvoldoende voedselopname met ernstig gewichtsverlies tot gevolg (meer dan 10 % van het lichaamsgewicht).
- Uitdroging (dorst, droge huid, droge lippen, weinig plassen).
- Een pijnlijke of gezwollen maag.
- Zeer frequent braken (meer dan driemaal per dag).

## Diarree

De behandeling met dasatinib kan leiden tot diarree. Dit betekent dat u vaker stoelgang maakt en dat uw stoelgang waterig kan zijn. Deze bijwerking is doorgaans licht tot matig ernstig.

## TIPS

- Drink regelmatig water zodat u een voldoende vochtopname hebt (1,5 liter).
- Bij grote vochtverliezen is meer vocht nodig (2 tot 2,5 liter). Drink dan bijvoorbeeld sportdranken zodat u ook de nodige mineralen binnen hebt bv. Aquarius, AA drink.
- Kijk regelmatig na of uw urine niet te donker is. Dit kan een teken zijn van uitdroging.
- Eet vet- en vezelarme voeding zoals:
  - pasta, wit brood of rijst
  - mager vlees (kalkoen, kip)



- **cornflakes**
- **vis**
- **geschild fruit**
- **Stop tijdelijk het eten van vezelrijke voeding.**
- **Het slijmvlies van de sluitspier kan geïrriteerd zijn door de diarree. Gebruik zacht toiletpapier of een washandje. Zorg voor een goede lichaamshygiëne en breng een zinkzalf aan ter hoogte van de sluitspier om de huid te beschermen.**
- **Vraag aan uw (huis)arts een geneesmiddel tegen diarree. Loperamide (Imodium®) mag u gebruiken.**

---

## LET OP

- **Vermijd voedingsmiddelen die de darmbeweging doen toenemen:**
  - **grote en vetrijke maaltijden**
  - **alcohol (bier, wijn)**
  - **cafeïnehoudende dranken (koffie, thee, chocolade)**
  - **voeding met grove vezels, zaden of pitten (volkorenbrood)**
  - **schillen van fruit, noten**
- **Vermijd voedingsmiddelen die de gasvorming verhogen:**
  - **ui, prei, kool, knoflook, paprika, komkommer, meloen**
  - **koolzuurhoudende dranken**
- **Vermijd voedingsmiddelen die de darmslijmvliesen irriteren: sterke kruiden en specerijen.**
- **Vermijd producten die sorbitol bevatten (snoepgoed & kauwgom).**
- **Vermijd melk- en zuivelproducten (melk, yoghurt, roomijs, kaas, room).**

---

### ! Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Als de diarree gepaard gaat met koorts, ernstige krampen of braakneigingen.
- Als u last hebt van uitdrogingsverschijnselen: een droge mond, een droge tong, droge lippen, een droge en verrimpelde huid en donkere urine.
- Als u last hebt van een bloederige stoelgang.

## Veranderingen ter hoogte van de huid

De behandeling met dasatinib kan bijwerkingen hebben ter hoogte van de huid. Die veranderingen kunnen zijn:

- een rode huid
- huiduitslag
- jeuk
- schilfering van de huid
- haarverlies

### TIPS

- **Gebruik regelmatig een verzachtende en vochtinbrengende crème, vooral op droge zones.**
- **Gebruik een neutrale vochtinbrengende crème, geen geparfumeerde crèmes.**
- **Neem liever een douche in plaats van een bad. In bad zal uw huid te veel verweken.**
- **Gebruik bij het douchen best een neutrale en ongeparfumeerde douchegel.**
- **Gebruik een hoge beschermingsfactor (bv. factor 50) bij blootstelling aan de zon.**
- **Draag best loszittende, katoenen kledij. Zorg voor een goede verluchting van de huid.**
- **Als u last hebt van jeuk, vraag dan een jeukstillend geneesmiddel aan uw arts of apotheker.**

### LET OP

- **Vermijd directe blootstelling aan de zon.**
- **Vermijd te warme of te veelvuldige douches.**

!

#### Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Als de huiduitslag en/of de jeuk hinderlijk wordt.

## Vermindering van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes

Door uw behandeling kunnen het aantal bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen verminderen.

### Rode bloedcellen

Rode bloedcellen zijn in ons lichaam belangrijk om zuurstof te vervoeren. Bij een verminderd aantal rode bloedcellen kan bloedarmoede optreden. Hierdoor kan u volgende symptomen hebben:

- vermoeid zijn
- verminderde inspanningscapaciteit
- algemeen gevoel van zwakte
- bleke huid en lippen
- duizeligheid
- kortademigheid bij inspanning

#### TIPS

- **Plan uw activiteiten op een dag. Wissel de activiteiten tijdig af met een korte rustpauze.**
- **Vraag aan anderen om ook een handje te helpen.**
- **Zorg voor een goede voeding met voldoende ijzer (runds- en lamsvlees, donkergroene bladgroenten, broccoli, bonen) en vitamine B (melk, eieren, kaas, vlees), vitamine C (paprika, kiwi) en foliumzuur (spinazie, broccoli, bonen, volkorenbrood).**
- **Drink voldoende.**

#### ! Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Als u zich duizelig voelt of kortademig bent.
- Als u zich bij de minste inspanning heel moe voelt.

### Witte bloedcellen

Bij een verminderd aantal witte bloedcellen verhoogt de kans op infectie. Witte bloedcellen zijn immers de soldaten van ons lichaam die vechten tegen indringers. Zonder witte bloedcellen kan u zich niet

verdedigen. Wanneer u zonder witte bloedcellen een infectie oploopt kan u zeer snel zeer ernstig ziek worden.

Een te laag aantal witte bloedcellen treedt meestal in het begin van de behandeling op, waarna de waarden gewoonlijk opnieuw normaliseren. Vooral in het begin van uw behandeling moet u hier op letten en bij koorts of infectie contact opnemen met het ziekenhuis. Indien u reeds langer dasatinib neemt zonder problemen, neemt u bij koorts of infecties best eerst contact op met uw huisarts die u zal doorverwijzen indien noodzakelijk.

Tekenen van infectie kunnen zijn:

- koorts, zweten, koude rillingen
- keelpijn, hoest, verstopte neus
- branderig gevoel bij het plassen
- ziektegevoel en uitputting
- roodheid, zwelling, ettervorming (lokale infectie)

#### TIPS

- **Meet regelmatig uw lichaamstemperatuur. Liefst steeds op hetzelfde tijdstip, bv 's avonds.**
- **Bij 38°C of meer, steeds uw huisarts of het ziekenhuis verwittigen!**
- **Let op een goede lichaamshygiëne. Was regelmatig uw handen.**
- **Pas een goede mondzorg toe en controleer uw mond op roodheid of aften.**
- **Voorkom wondjes. Wanneer u een wondje hebt: ontsmet deze onmiddellijk en volg dit dagelijks op.**
- **Vermijd contact met mensen die griep hebben of verkouden zijn.**
- **Vermijd druk bevolkte plaatsen, zoals winkels, bioscoop, zwembaden, sportmanifestaties, markt, ...**
- **Laat anderen tijdelijk uw huisdieren verzorgen.**

#### Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Als u tekenen van infectie waarneemt of koorts hebt.
- Vanaf 38°C STEEDS contact opnemen met uw behandelende arts, de verpleegkundig consulent of de verpleegkundige van de dagkliniek/hospitalisatieafdeling. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen in als u vermoedt dat u een infectie hebt.

## Bloedplaatjes

Bloedplaatjes spelen een rol bij de bloedstolling. Bij een ernstig te kort in bloedplaatjes heeft u een toegenomen risico op bloedingen. Het aantal bloedplaatjes kan ook verminderen door uw behandeling. Hierdoor vergroot de kans op blauwe plekken, onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloedend tandvlees,...

### ! Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Bij herhaaldelijke neusbloedingen die niet onmiddellijk te stelpen zijn.
- Bij bloedingen in de mond, urine, stoelgang,...

## Spierpijn

Dit is een vervelende maar ongevaarlijke bijwerking. Het wordt gekenmerkt door:

- spierkrampen
- spierspasmen

### TIPS

- **Sommige mensen vinden dat warmte een positief effect heeft op hun spierpijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een warmwaterkruik, kersenpit kussen, infrarood,... kunnen hierbij helpen.**
- **Een afkoelende crème kan u uw spierpijn eventjes doen vergeten.**
- **Massage verhoogt de doorbloeding in de spier waardoor de pijn vermindert.**
- **Bij veel last en in samenspraak met uw dokter kan u eventueel pijnstillers nemen.**

## Hoofdpijn

Hoofdpijn is een zeer frequente bijwerking, maar duurt meestal niet lang. Het gaat meestal over zonder enige interventie. De volgende tips kunnen uw hoofdpijn verzachten:

### TIPS

- **Neem regelmatig eens een frisse neus.**
- **Zorg ervoor dat u een goede nachtrust heeft.**
- **Neem voldoende ontspanning.**
- **Als de hoofdpijn te hinderlijk wordt, kan u een pijnstiller zoals paracetamol innemen. Indien hiermee geen beterschap, neemt u best contact op met uw arts**

---

#### LET OP

- **Neem niet te vaak en te lang na elkaar pijnstillers. Als u te veel pijnstillers gebruikt dan kan u juist daardoor hoofdpijn krijgen.**

---

#### ! Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Indien u heftige hoofdpijn krijgt, met koorts, een pijnlijke of stijve nek, sufheid of overgeven.
- Indien u ineens uitvalsverschijnselen krijgt, zoals een verlamde arm, een scheve mond, onduidelijk praten of minder zien.

## Vochtophoping (oedemen)

De behandeling met dasatinib kan gepaard gaan met gewichtstoename. Dit komt omdat dasatinib kan leiden tot het vasthouden van vocht (bv. rond de ogen of in de benen in uw lichaam).

#### TIPS

- **Controleer regelmatig uw gewicht.**
- **Wees matig met zout.**
- **Zorg voor voldoende beweging.**
- **Indien nodig zal uw arts u plaspillen voorschrijven om het extra vocht af te drijven.**

Dasatinib kan vochtophoping rond de longen (pleuravocht) veroorzaken. Dit kan in het begin van de behandeling optreden of pas na langere tijd onder de medicatie.



### Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Indien u last krijgt van kortademigheid, een benauwd gevoel

## 07 ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING EN VRUCHTBAARHEID

Mannen met een partner die zwanger kan worden en vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot 1 maand na stoppen van de behandeling met dasatinib. Vrouwen mogen **NIET zwanger** worden tijdens de behandeling met dasatinib omdat dasatinib een schadelijk effect kan hebben op de baby. Bespreek met uw arts wat de beste anticonceptiemethoden voor u en uw partner zijn.

Indien u een actieve zwangerschapswens heeft, bespreek dit met uw behandelende arts.

Vrouwen mogen **geen borstvoeding** geven tijdens de behandeling met dasatinib.

## 08 GENEESMIDDELEN, DRANKEN & PRODUCTEN OP BASIS VAN KRUIDEN OF PLANTEN DIE NIET GECOMBINEERD MOGEN WORDEN MET DASATINIB

Het gelijktijdig gebruik van sommige andere geneesmiddelen kan de hoeveelheid dasatinib in uw bloed verhogen of verlagen. Hierdoor kan u last krijgen van bijwerkingen of kan het effect van dasatinib verlaagd worden. Ook dasatinib zelf kan de hoeveelheid van andere geneesmiddelen in het bloed verhogen.

Voor u een behandeling met dasatinib start, is het belangrijk om uw arts of de ziekenhuisapotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Uw thuismedicatie zal bevroegd worden door een medewerker van de ziekenhuisapothek, eventueel telefonisch. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan



gecombineerd worden. Als er een aanpassing nodig is, wordt dit met uw behandelende arts besproken en wordt u op de hoogte gebracht.

Indien u een geneesmiddel inneemt of wenst in te nemen dat voorkomt in onderstaande lijst, geef dit dan steeds door aan uw arts, huisarts of de ziekenhuisapotheker! Onderstaande lijst vermeldt niet alle producten, dus meld alle wijzigingen in uw thuismedicatie steeds aan uw arts of ziekenhuisapotheker.

Vraag uw arts steeds of er bij het voorschrijven van nieuwe medicatie geen wisselwerking is met dasatinib. Er zijn websites beschikbaar voor uw arts waarop dit gecontroleerd kan worden en bij twijfel kunnen u of uw arts steeds contact opnemen met de dienst hematologie.

!

Het is belangrijk dat u steeds alle medicatie, alle voedingssupplementen of homeopathische middelen die u inneemt, doorgeeft aan uw arts of apotheker.

## Geneesmiddelen die de hoeveelheid dasatinib in uw bloed verhogen

- **Anti-schimmel middelen:** voriconazole (bv. Vfend<sup>®</sup>), fluconazole (bv. Diflucan<sup>®</sup>), itraconazole (Sporanox<sup>®</sup>), posaconazole (bv. Noxafil<sup>®</sup>)
- **Anti-virale middelen:** ritonavir (bv. Norvir<sup>®</sup>, Kaletra<sup>®</sup>, Paxlovid<sup>®</sup>),...
- **Antibiotica:** erythromycine (bv. Erythrocin<sup>®</sup>), clarithromycine (bv. Bictar<sup>®</sup>, Heliclar<sup>®</sup>)
- **Pompelmoes** in alle vormen: vers fruit, fruitsap (multivruchten),... Neem geen supplementen in die mogelijk grapefruit of pompelmoes bevatten.

## Geneesmiddelen die de hoeveelheid dasatinib in uw bloed verlagen

- **Anti-epileptica:** carbamazepine (Tegretol<sup>®</sup>), fenytoïne (Diphantoïne<sup>®</sup>), fenobarbital (Gardenal<sup>®</sup>),...
- **Antibiotica:** rifampicine (Rifadine<sup>®</sup>),...
- **Kruiden:** bv. preparaten op basis van Sint-Janskruid (*Hypericum perforatum*),...
- **Maagbeschermers :** (es)omeprazol(e) (bv. Sedacid<sup>®</sup>, Losec<sup>®</sup>, Nexiam<sup>®</sup>,...), pantoprazol(e) (Maalox Control<sup>®</sup>,...), lansoprazole (Dakar<sup>®</sup>), rabiprazol (Pariet<sup>®</sup>). Zie ook verder voor bijkomend advies.

## Geneesmiddelen waarvan de hoeveelheid in het bloed kan verhogen door dasatinib

- **Diverse geneesmiddelen:** pimozide (Orap<sup>®</sup>), ergotamine (Cafergot<sup>®</sup>), kinidine, terbinafine (Lamisil<sup>®</sup>),...

### **Bijkomend advies voor vaak gebruikte en vrij te verkrijgen medicatie:**

Hieronder vindt u advies over vaak gebruikte medicatie en hun wisselwerking met dasatinib. Deze informatie is bedoeld om, indien uw huisarts of apotheek bepaalde medicatie adviseert, te kijken of de medicatie geen problemen geeft bij inname van dasatinib. Opgelet, deze lijst is niet volledig!

### **Medicatie die het maagzuur vermindert**

Dasatinib zal pas goed werken als er voldoende maagzuur aanwezig is. Neem daarom geen geneesmiddelen die het maagzuur verminderen. Indien dit toch noodzakelijk is, bespreek de inname met uw arts of de ziekenhuisapotheker. Vrij verkrijgbare medicatie tegen maagzuur zoals Gaviscon<sup>®</sup> en Rennie<sup>®</sup> kan u eventueel gebruiken, maar neem deze minstens 2 uur na de inname van dasatinib in..

Voorbeelden van maagbeschermers zijn omeprazole, esomeprazole, Sedacid<sup>®</sup>, Losec<sup>®</sup>, Nexiam<sup>®</sup>, pantoprazole, Pantomed<sup>®</sup>,...

### **Pijnstillers**

Het sporadisch gebruik van paracetamol vormt geen probleem tijdens uw behandeling met dasatinib. Indien u paracetamol langdurig gebruikt, dient u dit te bespreken met uw arts.

U dient voorzichtig te zijn met het gebruik van ontstekingsremmers (zogenaamde NSAIDs) omdat deze het risico op bloedingen verhogen. Sporadisch gebruik vormt geen probleem, indien uw medische geschiedenis het gebruik hiervan toelaat (bv. niet indien u nierproblemen hebt).

Zwaardere pijnstillers zoals tramadol of morfinepreparaten hebben geen belangrijke wisselwerking met dasatinib. Indien uw (huis)arts dit voorschrijft, kan u dit innemen.

Voorbeelden van pijnstillers:

- NSAIDs: ibuprofen, diclofenac, Apranax<sup>®</sup>, Nurofen<sup>®</sup>,...
- Tramadol: Contramal<sup>®</sup>, Tradonal<sup>®</sup>,...
- Morfinepreparaten: Oxycontin<sup>®</sup>, MS Contin<sup>®</sup>, Oxynorm<sup>®</sup>,...

## Medicatie tegen de misselijkheid

Omwille van de wisselwerking met dasatinib wordt het gebruik van domperidone (Motilium®) afgeraden. In geval van misselijkheid kan u wel metoclopramide (Primperan®) gebruiken..

## Medicatie bij diarree

Het gebruik van loperamide (Imodium®) of Tiorfix® vormt geen probleem voor uw behandeling met dasatinib. Probiotica (Enterol®, Lacteol®,...) worden liever vermeden.

## Medicatie bij obstipatie

Het gebruik van laxativa type Movicol® of Forlax® vormt geen probleem tijdens uw behandeling met dasatinib.

## Medicatie tegen de cholesterol (statine-preparaten)

Indien uw arts deze behandeling opstart is er een voorkeur voor pravastatine of rosuvastatine omwille van afwezigheid van wisselwerking. Evenwel is er geen contra-indicatie voor de overige preparaten.

## Antibiotica

Indien u een infectie heeft en uw arts vindt dat u een antibioticakuur nodig heeft, dient u dit uiteraard in te nemen. Meld evenwel aan de arts dat u dasatinib inneemt, omdat sommige antibiotica een ongunstige wisselwerking hebben met dasatinib.

Antibiotica van het type amoxicilline of amoxicilline-clavulaanzuur vormen meestal geen probleem.

Voorzichtigheid is geboden met antibiotica van het type clarithromycine.

Bij twijfel kan de arts steeds contact opnemen met de dienst hematologie.

## Kruiden en voedingssupplementen

Sint-Janskruid: niet te gebruiken tijdens uw behandeling met dasatinib.

Pompelmoes(sap): niet te gebruiken tijdens uw behandeling met dasatinib.

## 09 VACCINATIES TIJDENS BEHANDELING MET DASATINIB

Houd er tijdens uw behandeling met dasatinib rekening mee dat vaccins iets minder effectief kunnen zijn en u dus mogelijk wat minder bescherming krijgt van het vaccin dan een gezonde persoon. Desondanks raden we u aan het griepvaccin jaarlijks toe te dienen, en wordt dit ook geadviseerd voor uw naasten om zo ook uw besmettingsrisico te verkleinen. Ook eventuele herhaalvaccins voor Covid-19 (SARS-CoV2) raden we u aan.

Voor andere vaccins raden we u aan advies in te winnen bij uw arts.

Belangrijk om te weten:

- dode of geïnactiveerde vaccins houden geen risico in, maar zijn soms minder zinvol als u een actieve behandeling krijgt;
- levende vaccins worden afgeraden tijdens uw behandeling omdat deze bij patiënten met een verminderde weerstand wel kunnen leiden tot besmettingen door het vaccin.

## 10 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 12u30-16u30
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Emailadres ziekenhuisapotheek: [apotheek.info@uzgent.be](mailto:apotheek.info@uzgent.be)

### Notities

.....

.....

.....

