

Aandachtspunten

- ▲ Als je langdurig behandeld wordt met **corticosteroiden** (zoals Medrol, Prednisolone enz.) hoef je die niet in te nemen op de dag van de behandeling met Rituximab.
- ▲ Als je aan **diabetes** lijdt, hou er rekening mee dat de dosis corticosteroiden (cortisone) die je krijgt voor de infusie je suikerwaarden kan ontregelen. Krijg je insuline, neem dan contact op met je behandelend endocrinoloog of diabeteseducator voordat je met Rituximab start. Mogelijk moet je behandelingsschema tijdelijk aangepast worden.
- ▲ **Zwangerschap en borstvoeding** worden afgeraden tot 12 maanden na de laatste toediening van Rituximab.
- ▲ Contacteer tijdig je arts bij **ziekte** of als je een **chirurgische ingreep** moet ondergaan. Mogelijk moet de toediening dan uitgesteld worden.

Mijn afspraken:

- / / om uur

- / / om uur

v.u.: Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – september 2023 – Versie 1 – Art. 030129

Reumatologie

Ingang 74, route 740

T +32 (0)9 332 22 52

www.uzgent.be/reumatologie

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



RITUXIMAB

TRUXIMA®
MABTHERA®
RIXATHON®
RUXIENCE®



RITUXIMAB

Je arts schreef een intraveneuze behandeling met Rituximab voor. Dat medicijn wordt gebruikt om klachten te behandelen bij verschillende immunologische aandoeningen.

Werking

Rituximab werkt selectief in op het immuunsysteem door bepaalde afweercellen, de B-cellen, tijdelijk uit te schakelen. Daardoor wordt de ontstekingsreactie die aan de oorsprong ligt van je aandoening afgeremd.

Het maximale effect van Rituximab wordt bereikt na ongeveer 12 weken.

Gebruik

Rituximab wordt ingezet voor verschillende immunologische aandoeningen zoals

- ▲ Reumatoïde artritis
- ▲ (Dermato)myositis
- ▲ Systeemlupus erythematosus
- ▲ Bepaalde vormen van vasculitis (bloedvatontsteking)
- ▲ IgG4-gerelateerde ziekte
- ▲ Systeemsclerose
- ▲ Interstitieel longlijden
- ▲ Pemphigus vulgaris (blaarziekte)
- ▲ Uveïtis (bepaald type oogontstekingen)
- ▲ ...

Je arts kan ervoor kiezen Rituximab te combineren met andere (reuma)medicatie.

Screeningsonderzoeken

Je arts doet vóór de eerste toediening van Rituximab een screening naar hepatitis B en C, hiv en soms ook tuberculose. Dat gebeurt via een bloedafname, longfoto of tuberculinehuidtest. Als de resultaten geruststellend zijn, kan je behandeling probleemloos ingepland worden. Bij afwijkende testresultaten neemt je arts contact met je op om na te gaan of bijkomende maatregelen nodig zijn.

Vaccinaties

Omdat een behandeling met Rituximab ervoor kan zorgen dat vaccinaties minder goed werken, word je aangeraden om (in samenspraak met je huisarts) je vaccinatieschema op punt te stellen vóór de eerste toediening van Rituximab.

We denken hierbij aan vaccinaties tegen:

- ▲ Griep
- ▲ Pneumokokken
- ▲ Mazelen-bof-rubella
- ▲ Difterie-tetanus-kinkhoest
- ▲ COVID-19
- ▲ ...

Voor een optimale reactie op deze vaccinaties worden ze bij voorkeur toegediend ten laatste één maand vóór of ten vroegste zes maanden na de behandeling met Rituximab.

Onder behandeling met Rituximab mag je niet gevaccineerd worden met levende vaccins zoals gele koorts, mazelen-bof-rubella enz.

Toediening

Als je een behandeling met Rituximab nodig hebt, zijn er verschillende mogelijke behandelingsschema's. Door gaans krijg je twee opeenvolgende toedieningen met twee weken tussen. De behandeling kan vanaf zes maanden herhaald worden. Variaties op dit schema zijn mogelijk. Je arts beslist op basis van je aandoening en medische toestand.

De toediening van Rituximab verloopt altijd via **dag-opname** in het dagziekenhuis, slechts in uitzonderlijke omstandigheden tijdens een meerdaagse opname. Meld je liefst 30 minuten voor de geplande toediening aan bij Aanmelden en inschrijven. Je hoeft **niet nuchter** te zijn.

Een eerste toediening van Rituximab duurt ongeveer zes uur. Vanaf een tweede toediening duurt de behandeling iets minder lang en reken je best op zo'n vijf uur. Aan gezien je enkele uren in het ziekenhuis aanwezig bent, vragen we je om een **lunchpakket en voldoende drinken** mee te nemen.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn o.a. koorts, rillingen, kortademigheid, jeuk, huiduitslag, misselijkheid, hoge of lage bloeddruk. Om het risico op bijwerkingen te verminderen, krijg je voor iedere infusie een anti-allergiemiddel, corticosteroïden (cortisone) en paracetamol toegediend. Als je toch bijwerkingen krijgt, dan doen ze zich meestal voor als je het infuus krijgt. Dan kan je arts de infusie vertragen of onderbreken.

Omdat Rituximab het immuunsysteem onderdrukt, ben je mogelijk vatbaarder voor infecties. Bij koorts of andere tekenen van infectie neem je het best contact op met je behandelend arts of huisarts.