

JOUW BEHANDELING MET GAZYVARO® EN VENCLYXTO®

INHOUD

01	Welke therapie krijg je?	3
02	Hoe verloopt je behandeling?	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Aandachtspunten bij de inname van Venclyxto®	5
05	Onderzoeken	5
06	Medicatie	6
07	Bijwerkingen	6

01 WELKE THERAPIE KRIJG JE?

Je behandeling bestaat uit een combinatie van **twee** producten: Gazyvaro® (obinutuzumab) en Venclyxto® (venetoclax).

Gazyvaro® of obinutuzumab is een antilichaam. Antilichamen zijn eiwitten die binden aan specifieke cellen. In dit geval bindt Gazyvaro® aan een welbepaald type witte bloedcel, namelijk de B-lymfocyt. De binding van die antilichamen aan het oppervlak van de cellen zorgt ervoor dat die laatste afsterven.

Venclyxto® remt de werking van een specifiek eiwit, het zogenaamde B-cellymfoom (BCL-2), dat verantwoordelijk is voor de overleving van kankercellen en hun resistentie tegen bepaalde antikankergeneesmiddelen. Door de verminderde werking van BCL-2 zijn de kankercellen niet meer in staat om te groeien of om zich te vermenigvuldigen en sterven ze af.

02 HOE VERLOOPT JE BEHANDELING?

Bij de opstart van je behandeling word je voor de eerste toediening opgenomen op onze verpleegafdeling (ingang 12, route 1467 of route 1416) gedurende een drietal dagen.

De verdere behandeling dienen we gewoonlijk in het dagziekenhuis toe (ingang 12, route 1323). In het dagziekenhuis kom je altijd terecht op een tweepersoonskamer. 's Middags krijg je op de afdeling een lunchpakket aangeboden. Je hoeft vooraf niet nuchter te zijn; een lichte maaltijd die dag kan zelfs aangewezen zijn om misselijkheid te voorkomen.

Voor de start van elke toediening voeren we een **bloedafname** uit. Afhankelijk van die resultaten starten we de therapie op of stellen we ze uit naar een later moment. Je krijgt de behandeling via een intraveneus infuus toegediend.

Vóór de start van Gazyvaro® krijg je premedicatie toegediend om mogelijke allergische reacties tegen te gaan. Tijdens het inlopen van de therapie volgt de verpleegkundige je van dichtbij op. Om allergische reacties te vermijden spreiden we de toediening van Gazyvaro® bij de eerste cyclus over twee dagen en drijven we de inloopsnelheid per half uur op. Hierbij houden we jouw bloeddruk nauwlettend in de gaten. De gemiddelde inlooptijd van Gazyvaro® is voor de eerste twee toedieningen ongeveer vier uur, vanaf de derde toediening is dat gemiddeld drie uur. Dat kan variëren van persoon tot persoon.

03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

Bij de eerste cyclus krijg je Gazyvaro® op dag 1, dag 2, dag 8 en dag 15 toegediend. Eén cyclus duurt vier weken. Vanaf de tweede cyclus dienen we Gazyvaro® enkel op dag 1 toe in het dagziekenhuis (maandelijks).


Vanaf cyclus 1, dag 22 starten we ook Venclyxto® op, waarvoor je opnieuw twee dagen wordt opgenomen.

Er bestaan drie soorten Venclyxto®-tabletten: 10 mg, 50 mg en 100 mg. Meestal starten we met een **dagelijkse dosis van 20 mg** gedurende zeven dagen. We **bouwen de dosis geleidelijk op** over een periode van vijf weken, om te komen tot een dagelijkse dosis van **400 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of de behandeling tijdelijk onderbreken.

Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip één keer per dag** met een half glas water. Tijdens het dosis-opbouwschema moet je Venclyxto® 's morgens innemen.

Dagelijkse dosis: _____ mg = _____ tablet(ten) Venclyxto® _____ mg

De totale behandeling duurt één jaar.



* Infuus. Gazyvaro® start op dag 1 van de 1ste cyclus met 100 mg, gevolgd door 900 mg op dag 1 of 2. Stopt na 6 maanden (6 cycli van 28 dagen)

** Tablet. Venclyxto® start op dag 22 van cyclus 1. Stopt na 1 jaar (12 cycli van 28 dagen).

04 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE INNAME VAN VENCLYXTO®

- ▲ Neem Venclyxto® **ALTIJD MET voedsel** in.
- ▲ Slik de tablet(ten) **in hun geheel** door met een **half glas water**. Je mag de tablet(ten) **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.
- ▲ Tijdens een behandeling met Venclyxto® mag je geen pompoelmoes, sterfruit, granaatappel of producten op basis van sint-Janskruid gebruiken.
- ▲ Als je tijdens je behandeling met Venclyxto® nog andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen inneemt of overweegt in te nemen, meld dat dan aan je arts of apotheker.

Als je een dosis bent vergeten en het duurt nog 8 uur of meer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tablet(ten) dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 8 uur duurt tot je normaal de volgende dosis zou innemen, sla de vergeten dosis dan over. Ga de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet(ten) in te halen.

Venclyxto® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.

Neem altijd contact op met je arts wanneer je een vaccinatie overweegt. Sommige vaccins geven immers een verhoogde kans op infecties, omdat het immuunsysteem verzwakt is door ziekte en/of behandeling. Het gebruik van deze vaccins raden we af.

Als je je vermoeid voelt door de behandeling met Venclyxto®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.

Drink voldoende (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens de eerste vijf weken van de behandeling met Venclyxto®, zodat de afbraakproducten van de kankercellen vlot via de urine uit je lichaam kunnen verwijderd worden.

05 ONDERZOEKEN

De arts bepaalt wanneer er een **tussentijdse evaluatie** plaatsvindt. Dat gebeurt meestal na vier cycli met enkele onderzoeken. Enkele frequent voorkomende onderzoeken zijn:

- ▲ een bloedonderzoek
- ▲ een CT-scan (voor de evaluatie van het effect van de behandeling)
- ▲ een beenmergonderzoek (geen standaardonderzoek; je arts bespreekt met jou wanneer dit onderzoek nodig is)

06 MEDICATIE

Vertel je behandelende arts zeker **welke andere geneesmiddelen je neemt**. Die kunnen de werking van de chemotherapie beïnvloeden. Vermeld niet alleen medicatie op voorschrift, maar ook de (genees)middelen die je **zonder voorschrift** kan kopen zoals kruiden, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines.

07 BIJWERKINGEN

Het is mogelijk dat er tijdens de behandeling bijwerkingen optreden. De intensiteit verschilt van persoon tot persoon. Vertel je behandelend team altijd welke bijwerkingen je ervaart. Ze geven je graag advies en tips om de klachten te verminderen of te behandelen.

Maak je geen zorgen als je weinig last hebt van bijwerkingen. Dat betekent zeker niet dat de therapie onvoldoende of niet werkt.

Gazyvaro® (obinutuzumab)

Enkele bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de toediening van Gazyvaro® (obinutuzumab) zijn:

- ▲ koorts
- ▲ rillingen
- ▲ spierstijfheid
- ▲ misselijkheid
- ▲ verlaagde bloeddruk
- ▲ vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen)
- ▲ pijn op de borst
- ▲ huiduitslag

We noemen dat een **infuusreactie** (= een overgevoeligheidsreactie). De premedicatie die je voor de start van de behandeling krijgt, moet dergelijke reacties voorkomen. Toch kunnen we een infuusreactie niet volledig uitsluiten.

Als de bovenstaande bijwerkingen optreden, stoppen we de toediening onmiddellijk. De behandelende arts geeft dan de nodige medicatie om de reactie onder controle te krijgen. Daarna starten we de behandeling opnieuw op, op advies van de arts.

Venclyxto® (venetoclax)

- ▲ Verminderd aantal rode en witte bloedcellen
- ▲ Vermoeidheid, algemene lichaamszwakte
- ▲ Infecties (vaak van de longen)
- ▲ Misselijkheid en braken
- ▲ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)



Hoe je de bijwerkingen ervaart, is heel persoonlijk. Veel hangt af van de soort en hoeveelheid chemotherapie die je krijgt. Iedereen reageert anders op de toediening. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen hebben er minder last van. De ernst van de bijwerkingen vermindert meestal na de behandeling en zegt niets over de effectiviteit van de behandeling.

Vermeld eventuele bijwerkingen wel altijd aan je arts of verpleegkundige. Zo kunnen we zoeken naar oplossingen om de bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Hemato-oncologie en stamceltransplantatie'.

VRAGEN? NOTEER ZE HIER

[illegible]