

# JOUW BEHANDELING MET BRIGATINIB (ALUNBRIG®)

## INHOUD

|    |                                          |   |
|----|------------------------------------------|---|
| 01 | Wat doet dit geneesmiddel?               | 3 |
| 02 | Inname                                   | 3 |
| 03 | Pletten / breken                         | 3 |
| 04 | Combinatie met andere geneesmiddelen     | 4 |
| 05 | Bijzondere voorzorgsmaatregelen          | 4 |
| 06 | Wat moet je doen bij een vergeten dosis? | 5 |
| 07 | Voornaamste bijwerkingen                 | 5 |
| 08 | Bewaring                                 | 6 |
| 09 | Waar verkrijgbaar?                       | 6 |



## 01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Alunbrig® gebruiken we voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk **ALK-positief** gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Dat betekent dat jouw kankercellen een verandering hebben in een gen met de naam ALK (anaplastisch-lymfoomkinase). Alunbrig® remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een specifieke stof in sommige kankercellen.

Alunbrig® bevat de werkzame stof brigatinib.

## 02 INNAME

Volg de instructies van je behandelende arts.

Neem elke dag **1 tablet** in met water. Je begint met een **dosis van 90 mg Alunbrig®** gedurende de **eerste 7 dagen** van de behandeling. Als je de behandeling de eerste week goed verdraagt, kan de arts je **dosis verhogen naar 180 mg** één keer per dag.

De duur van de behandeling hangt af van hoe je de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms is een dosisverlaging of zelfs tijdelijke therapiestop nodig omdat de bijwerkingen hinderlijk zijn. Die beslissing gebeurt altijd in overleg met de behandelende arts.

## 03 PLETTEN / BREKEN

Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water, zonder te kauwen. Je mag de tabletten **NIET** breken, **NIET** pletten en **NIET** oplossen. Neem Alunbrig® één keer per dag in, elke dag op hetzelfde tijdstip.

## 04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor je een behandeling met Alunbrig® start, moet je je arts of apotheker melden welke andere geneesmiddelen je gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Alunbrig® verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen. Dat geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen.

We kijken na of je thuismedicatie kan interageren met Alunbrig®. Als dat zo is, moet jouw thuismedicatie mogelijk aangepast worden. Dan brengen we jou daarvan op de hoogte.

## 05 BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN

- ▲ **Vermijd pompelmoes** en pompelmoessap. Dat kan de hoeveelheid Alunbrig® in je bloed veranderen.
- ▲ Ben je een vrouw in de vruchtbare leeftijd, dan raak je beter **niet zwanger**. Vanaf de start van de behandeling tot ten minste vier maanden na de laatste dosis Alunbrig® moet je effectieve niet-hormonale anticonceptie gebruiken.
- ▲ Als man kan je tijdens de behandeling beter **geen kind verwekken**. Heb je een partner in de vruchtbare leeftijd, dan moet je vanaf de start van de behandeling tot ten minste drie maanden na de laatste dosis effectieve anticonceptie gebruiken.
- ▲ Als je Alunbrig® krijgt toegediend terwijl je zwanger bent, kan de foetus letsel oplopen. Dit middel mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij je klinische toestand een behandeling met Alunbrig® noodzakelijk maakt.
- ▲ **Geef geen borstvoeding**. Het is niet bekend of Alunbrig® in de moedermelk wordt uitgescheiden en mogelijk kan dit middel de baby letsels toebrengen.
- ▲ Alunbrig® kan gezichtsstoornissen, duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Als dergelijke symptomen optreden, **mag je niet autorijden en geen machines bedienen**.
- ▲ **Alunbrig® bevat lactose**. Als je bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met je arts voordat je dit middel inneemt.

## 06 WAT MOET JE DOEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS?

- ▲ Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem je volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
- ▲ Als je na de inname van Alunbrig® moet braken, mag je geen andere tabletten innemen tot aan de volgende geplande dosis.
- ▲ Heb je te veel van dit middel ingenomen dan de aanbevolen dosis? Breng je arts of apotheker onmiddellijk op de hoogte.
- ▲ Als je zou overwegen om te stoppen met Alunbrig®, overleg dan altijd eerst met je arts.
- ▲ Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

## 07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

Vertel het direct aan je arts als je een of meer van de onderstaande bijwerkingen krijgt na het innemen van dit geneesmiddel. Je arts kan je dosering verlagen, je behandeling voor korte tijd onderbreken of je behandeling volledig stoppen.

### Dit kan je ervaren:

- ▲ hoge bloeddruk
- ▲ zichtproblemen
- ▲ onverklaarbare pijn, gevoeligheid of zwakte in je spieren
- ▲ pijn in de bovenbuik, waaronder buikpijn die erger wordt bij eten en mogelijk uitstraalt naar de rug
- ▲ gewichtsverlies of misselijkheid
- ▲ pijn aan de rechterkant van de maagstreek, geler kleuren van de huid of van het oogwit, of donkere urine
- ▲ verhoogde bloedsuikerspiegel
- ▲ longontsteking
- ▲ trage hartslag
- ▲ gevoeligheid voor zonlicht

## 08 BEWARING

- ▲ Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vind je op het etiket op de flacon of blisterverpakking en op de doos na 'EXP'.
- ▲ Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
- ▲ Spoel geneesmiddelen niet door de wasbak of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt.

## 09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng je identiteitskaart mee als je het geneesmiddel komt afhalen.

Alunbrig® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

### Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

- ▲ maandag tot vrijdag: 8-20 uur
- ▲ zaterdag: 8-12 uur en 13-16.30 uur
- ▲ zondag: 8-13 uur
- ▲ feestdagen:
  - maandag, vrijdag of zaterdag: 8-16.30 uur
  - dinsdag, woensdag, donderdag of zondag: 8-13 uur

**Telefoonnummer ziekenhuisapotheek:** +32 9 332 32 41

---

**Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?**

Je vindt alle info op [www.uzgent.be/folders-kankercentrum](http://www.uzgent.be/folders-kankercentrum) onder de rubriek 'Thoracale oncologie'.

---

## VRAGEN? NOTEER ZE HIER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.