
Intraveneuze katheterzorg

Mieke Debrauwere, verpleegkundig specialist

T +32 (0)9 332 24 17

E mieke.debrauwere@uzgent.be

www.uzgent.be/verzorging-van-een-katheter

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

EEN CENTRALE KATHETER AFSLUITEN MET TAUROSEPT®



EEN CENTRALE KATHETER AFSLUITEN MET TAUROSEPT®

Bij patiënten met een getunnelde katheter, poortkatheter of PICC met (home) TPN is het belangrijk om infecties te vermijden. In deze brochure lees je meer over Taurosept®, een oplossing om een centrale katheter veilig af te sluiten.

Wat is Taurosept®?

Het actieve bestanddeel van Taurosept® is taurolidine 2%. Dat is een breedspectrumantisepticum dat de groei van micro-organismen tegen de interne wand van de katheter verhindert. Als de katheter tussen twee intraveneuze toedieningen met Taurosept® gevuld wordt, is de kans op groei van bacteriën en gisten, en bijgevolg een katheterinfectie, kleiner dan wanneer een fysiologisch slot geplaatst wordt.

Handhygiëne en strikte aseptische technieken bij manipulatie van de katheter blijven echter de meest essentiële maatregelen om het ontstaan van katheterinfecties te voorkomen.

Taurosept® bewaren

De Taurosept®-vials moeten op kamertemperatuur (tussen de 15 - 25 °C) bewaard worden en dus niet in de koelkast.

Klaarmaken voor gebruik

- ▶ Ontsmet de handen met handalcohol.
- ▶ Controleer of er geen zichtbare partikels aanwezig zijn in de vial. Houd de vial rechtop en verwijder alle vloeistof uit de kop van de vial door er zachtjes tegen te tikken.
- ▶ Verwijder de kop van de vial door zachtjes te draaien. Zet de spuitmond rechtstreeks op de vial met een duw-draaibeweging, houd ondersteboven en trek op.

- ▶ Trek de juiste dosis Taurosept® op in een spuit van 10 ml:
 - Volwassene: minimum 2 ml
 - Kind: minimum 1,5 ml

Taurosept®-slot instilleren

- ▶ Houd een in ontsmettingsalcohol gedrenkt kompres onder de naaldloze connector.
- ▶ Deconnecteer de infuusleiding.
- ▶ Spoel de katheter pulserend met 10 ml NaCl 0,9% of met 2 x 10 ml NaCl 0,9% na TPN.
- ▶ Instilleer bij een volwassene 2 ml of bij een kind 1,5 ml Taurosept® in de katheter. Laat de taurolidine 2% ter plaatse tot de volgende intraveneuze toediening (maximum 1 week voor een PICC of getunnelde katheter, maximum 4 weken voor een poortkatheter).

Taurosept®-slot aspireren?

Het Taurosept®-slot hoeft niet geaspireerd te worden vóór een volgende intraveneuze toediening langs de katheter. Taurolidine veroorzaakt namelijk geen bijwerkingen bij de patiënt wanneer het in het lichaam terechtkomt. Bovendien zorgt het feit dat geen bloed geaspireerd wordt voor een bijkomend voordeel wat occlusiepreventie betreft.

