

# NINTEDANIB (VARGATEF®)

---

KANKERCENTRUM



---

## INHOUDSOPGAVE

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 01 | Wat doet dit geneesmiddel?           | 3 |
| 02 | Inname                               | 3 |
| 03 | Pletten / breken                     | 3 |
| 04 | Combinatie met andere geneesmiddelen | 4 |
| 05 | Bijzondere voorzorgsmaatregelen      | 4 |
| 06 | Maatregelen bij een vergeten dosis   | 4 |
| 07 | Voornaamste bijwerkingen             | 5 |
| 08 | Bewaring                             | 5 |
| 09 | Waar verkrijgbaar?                   | 5 |

## 01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Vargatef<sup>®</sup> wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), bij volwassen patiënten. Vargatef<sup>®</sup> remt de groei en verspreiding van de kankercellen door zich vast te hechten aan een bepaalde stof in sommige kankercellen.

Vargatef<sup>®</sup> bevat de werkzame stof Nintedanib.



## 02 INNAME

U neemt dagelijks uw dosis Vargatef<sup>®</sup> in, behalve op de dag van de toediening van uw chemotherapie (docetaxel).

De gebruikelijke dosering is **twéemaal per dag 2 capsules van 100 mg bij de maaltijd** (de totale dagdosis is dus 400 mg). Slik de capsules in hun geheel door met een glas water. Neem de capsules in met ongeveer 12 uur ertussen, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten. Kies voor vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om de dosis (tijdelijk) te verminderen of uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

## 03 PLETTEN / BREKEN

Slik de capsules in hun geheel in met een glas water. U mag de capsules niet openen, oplossen, breken, kauwen of pletten.

## 04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met Vargatef® start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Vargatef® verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Een medewerker van de ziekenhuisapothek belt u in de komende weken op om uw thuismedicatie te overlopen. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

## 05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid. Deze producten kunnen de werking van Vargatef® nadelig beïnvloeden.
- Het is aangeraden dat vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 3 maand na de behandeling met Vargatef®

## 06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

Het is belangrijk dit geneesmiddel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten:

- Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal gezien inneemt? Neem de vergeten dosis dan toch nog in. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
- Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de gemiste dosis dan over. Vertel dit aan uw verpleegkundige of arts bij uw volgende bezoek.

Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u moet braken nadat u een dosis Vargatef® heeft ingenomen, neem dan geen extra dosis in maar neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

## 07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- Diarree
- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust
- Huiduitslag / jeuk
- Verhoogde leverenzymen
- Bloedingen (vb. bloedneus)
- Pijnlijk, gevoelloos en/of tintelend gevoel in vingers en tenen
- Ontsteking van de slijmvliezen die het spijsverteringskanaal bekleden (vb. mondslijmvlies)

Telefoonnummer oncologisch consulent: +32 9 332 07 99

## 08 BEWARING

Vargatef® moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

## 09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Vargatef® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

## Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Maandag-vrijdag:      | 8u-20u              |
| Zaterdag:             | 8u-12u en 13u-16u30 |
| Zondag en feestdagen: | 8u-13u              |

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

## Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.