

XGEVA® (DENOSUMAB)

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE / INHOUD(SOPGAVE)

01	Hoe werkt XGEVA®?	3
02	Hoe verloopt de behandeling?	3
03	Adviezen bij de behandeling	4
04	Bijwerkingen van Xgeva®	4
05	De kostprijs	5

01 HOE WERKT XGEVA®?

XGEVA® (Denosumab) is een eiwit (monoklonaal antilichaam) dat de botafbraak door bot-metastasen afremt. Botmetastasen zijn uitzaaiingen van kanker in het bot. Botmetastasen kunnen allerlei klachten geven, waarbij pijn meestal op de voorgrond staat. Verder kunnen uitzaaiingen in het bot aanzienlijke complicaties veroorzaken. Zo kunnen er botbreuken of indeukingsfracturen ontstaan doordat de uitzaaiingen ervoor zorgen dat het bot zwakker wordt. Door de toediening van Xgeva® worden de botten versterkt en wordt de kans op complicaties en het ontstaan van nieuwe botmetastasen verminderd.

02 HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De behandeling gebeurt door middel van een subcutane (onderhuidse) inspuiting in de dij, buik of bovenarm om de 4 weken. Hiervoor kunt u naar de dagkliniek medische oncologie (Ingang 50, route 612) komen, maar dit kan ook via de huisarts of thuisverpleging gebeuren. De spuit dient in de koelkast te worden bewaard, maar de injectie wordt op kamertemperatuur ingespoten (je neemt de spuit best de dag voor de geplande toediening uit de koelkast).

Tijdens uw behandeling wordt ook calcium en vit D toegediend. Aangezien calcium uit het bloed wordt onttrokken voor de botopbouw, dient elke behandeling met Xgeva® aangevuld te worden met calciumsupplementen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld volgende producten worden voorgeschreven door uw arts: Steovit D3, Cacit D3, D-Vital... Tussendoor worden bloedafnames gepland om het calciumgehalte in uw lichaam op te volgen.

SCHEMA bij botuitzaaiingen

	Product	Vorm	Opmerking
Dag 1	Xgeva®	1 flacon subcutaan (120 mg)	
	Calcium/Vitamine D supplement	Comprimé, poeder, kauwtablet, ...	Dagelijks innemen vanaf start van de behandeling
Dag 28	Volgende inspuiting Xgeva®	1 flacon subcutaan (120 mg)	

De inspuiting wordt om de 4 weken herhaald. De arts zal bepalen hoelang de behandeling dient gegeven te worden.

Xgeva® wordt ook gebruikt voor de therapeutische behandeling van reusceltumoren. Het toedieningsschema is anders dan dit voor botmetastasen. Hier zal er een oplaaddosis worden gegeven. Concreet wil dit zeggen dat er wekelijks een inspuiting met Xgeva® wordt gegeven voor de eerste drie weken, 2 weken later wordt er opnieuw een inspuiting toegediend en vervolgens zal om de 4 weken een inspuiting worden gegeven.

SCHEMA bij reusceltumoren

	Product	Vorm	Opmerking
Dag 1	Xgeva®	1 flacon subcutaan (120 mg)	
Dag 8 Dag 15 Dag 28	Calcium/Vitamine D supplement	Comprimé, poeder, kauwtablet	Dagelijks innemen vanaf start van de behandeling
Dag 56	Vierwekelijkse toedieningen Xgeva®	1 flacon subcutaan (120 mg)	Zie schema bij botuitzaaiingen

03 ADVIEZEN BIJ DE BEHANDELING

Het is aan te raden om voor de start met Xgeva® langs te gaan bij de tandarts voor een uitgebreide gebitscontrole. Ook is een goede mondhygiëne gewenst omdat de toediening van Xgeva® in zeldzame gevallen een aantasting van het kaakbeen kan veroorzaken.

De symptomen hiervan zijn: pijn, zwelling, tandvleesproblemen, loskomen van de tanden en aantasting bot, ontsteking van het kaakbeen... Het is afgeraden om gedurende uw behandeling met Xgeva® een invasieve tandingreep te laten uitvoeren. Indien dit toch noodzakelijk zou zijn, dan neemt u best contact op met uw behandelende arts en stelt u uw tandarts op de hoogte over het gebruik van Xgeva®.

04 BIJWERKINGEN VAN XGEVA®

Het is mogelijk dat er tijdens uw behandeling met XGEVA bijwerkingen optreden maar meestal wordt deze heel goed verdragen en zijn er weinig klachten.

De ernst van deze bijwerkingen verschilt van persoon tot persoon. Het is steeds belangrijk om uw arts, de verpleegkundige of de apotheker op de hoogte te brengen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Ze zullen u adviezen geven om de klachten te verminderen of te behandelen. Wees niet ongerust als u weinig bijwerkingen ervaart. Dit wijst niet op een onvoldoende werking van de therapie.

In de eerste 3 dagen na toediening van Xgeva® kan er een acute fase reactie optreden. De symptomen hiervan kunnen zijn: botpijn, koorts, vermoeidheid, gewrichtspijn, spierpijn en stijfheid. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen enkele dagen en zijn vergelijkbaar met een griepig gevoel. U mag hiervoor paracetamol (Dafalgan®) innemen.

Neem contact op met uw arts wanneer u onderstaande verschijnselen merkt tijdens uw behandeling:

- trekkingen of krampen in uw spieren
- gevoelloosheid of tintelingen in uw vingers, tenen of rond uw mond.

⇒ Dit kan wijzen op een te laag calciumgehalte in uw bloed.

- Huiduitslag/jeuk
- Opgezwollen mond, tong, keel of gezicht
- Koorts
- Ademhalingsproblemen
- Rode plekken op de huid

⇒ Dit kan wijzen op een overgevoeligheid van het medicijn. Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken.

!

Het is belangrijk om anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met Xgeva en dit tot 3 maanden na het stoppen van de behandeling. Er zijn echter geen gevolgen met betrekking tot vruchtbaarheid. Indien er toch sprake zou zijn van een zwangerschap, is het belangrijk om contact op te nemen met de behandelende arts.

05 DE KOSTPRIJS

Xgeva® is geen goedkoop product maar door de terugbetaling is het remgeld laag.

Vergeet niet om het attest voor terugbetaling te laten invullen door uw behandelende arts. Dit is geldig voor 48 weken en dient nadien verlengd te worden.