

UW BEHANDELING MET MELFALAN – PREDNISOLONE – VELCADE

KANKERCENTRUM
UZ GENT



INHOUDSTAFEL

01	Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u?	3
02	Vorbereiding en verloop van de behandeling	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Onderzoeken	5
05	Medicatie	5
06	Bijwerkingen	5

01 WELKE CHEMOTHERAPIE (= BEHANDELING MET CYTOSTATICA) KRIJGT U?

Uw behandeling bestaat uit 3 producten: Melfalan, Prednison en Velcade® (Bortezomib).

Bortezomib, met als merknaam Velcade®, is een doelgerichte therapie. Het geneesmiddel zal de afbraak van eiwitten in de cel verstoren. Zo ontstaat er een overaanbod aan eiwitten, waardoor de kankercellen onvoldoende bouwstoffen hebben om te overleven. Het onevenwicht zorgt dus voor het afsterven van de kankercellen.

Melfalan is een alkylarend geneesmiddel (=chemotherapie) dat de celgroei afremt.

Prednisolone is géén cytostaticum (= celdodend middel), maar wel een cortisone-afgeleide.

Generische naam	Specialiteitsnaam	Specifieke werking
Bortezomib	Velcade®	Proteasoomremmer
Prednisolone	Prednisolone®	Glucocorticosteroïden
Melfalan	Alkeran®	Antitumoraal middel

02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Een deel van deze behandeling, namelijk Velcade® wordt op de dagkliniek (ingang 12, route 1323) toegediend via een onderhuidse inspuiting (SC). Bij een opname op de dagkliniek komt u steeds terecht op een 2-persoonskamer. 's Middags krijgt u op de afdeling een lunchpakket aangeboden. U hoeft vooraf niet nuchter te zijn, een lichte maaltijd die dag kan zelfs aangewezen zijn om misselijkheid te voorkomen.

Bij de start van iedere chemotherapie wordt een bloedafname uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten kan de therapie opgestart, maar ook uitgesteld worden naar een later moment (dit in overleg met de arts).

Voor de toediening van Velcade® krijgt u medicatie (Litican®) toegediend in pilvorm (PO) om misselijkheid en braken te voorkomen. Deze mag u thuis verder innemen indien nodig ongeveer 30 minuten voor iedere maaltijd.

Prednisolone en Melfalan dient u thuis in pilvorm in te nemen.

Naast de Prednisolone, Melfalan en Velcade® zal uw arts u nog andere ondersteunende medicatie voorschrijven. Hiervoor verwijzen we graag naar het medicatierooster dat u van uw arts zal ontvangen.

03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

Eén cyclus omvat 35 dagen (= 5 weken) behandeling, tijdens deze 5 weken wordt u op dag 1, 8, 15 en 22 verwacht op de dagkliniek voor uw Velcade® toediening.

Uw behandeling op de dagkliniek ziet er als volgt uit:

	Product	Vorm	Werking	Tijdstip of tijdsduur
1	Litican 100 mg	Oraal	Tegen de misselijkheid	In te nemen voor Velcade
2	Velcade	SC	Proteasoomremmer	5 min.

Prednisolone® en Melfalan dient u thuis in te nemen op DAG 1, DAG 2, DAG 3 en DAG 4.

Tips bij de inname van Melfalan

- Neem Melfalan steeds in op een lege maag (1 uur voor de maaltijd of 2 uur na de maaltijd). Bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip.
- De capsule in zijn geheel inslikken zonder te kauwen.
- Bewaar de medicatie in de koelkast en buiten het bereik van kinderen.

Tips bij de inname van Prednisolone

- Neem Prednisolone steeds in bij de maaltijd, bij voorkeur 's morgens.

04 ONDERZOEKEN

De arts bepaalt wanneer er een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden, dit is meestal na 4 cycli. Enkele frequent voorkomende onderzoeken zijn:

- Een bloedonderzoek
- Een beenmergonderzoek (bij evaluatie van effect behandeling)
- Een NMR-scan, RX- of CT-scan van het volledige lichaam (bij evaluatie van effect behandeling)

05 MEDICATIE

Informeer steeds uw behandelende arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt!

- ⇒ **Zowel de geneesmiddelen die worden voorgeschreven, als de (genees)-middelen die u zonder voorschrift gebruikt (bv. Kruidenpreparaten of vitamines)!**

06 BIJWERKINGEN

Bijwerkingen veroorzaakt door:

- Bortezomib – Velcade®
- Melfalan – Alkeran®
- Prednisolone

Bortezomib – Velcade®

Enkele bijwerkingen die mogelijks kunnen optreden tijdens de behandeling met Velcade® zijn:

- Vermoeidheid
- Maag- en darmproblemen: Misselijkheid, braken, diarree, constipatie
- Onderdrukking van de bloedplaatjes
- Zenuwontstekingen (= perifere neuropathie): Onprettig, prikkelend, tintelend, brandend gevoel, dat pijnlijk kan zijn of kan leiden tot een verminderde gevoeligheid in handen of voeten.

Melfalan – Alkeran®

Enkele bijwerkingen die mogelijks kunnen optreden tijdens de behandeling met Melfalan zijn:

- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd, met als gevolg: verhoogde vatbaarheid voor infecties, bloedarmoede, sneller blauwe plekken en/of een bloedneus.
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Ontsteking mondslijmvlies waarbij blaasjes en pijn in de mond kunnen voorkomen.

Prednisolone

Enkele bijwerkingen die zich mogelijks kunnen voordoen gedurende de behandeling met Dexamethasone zijn:

- Maaglast
- Zenuwachtigheid
- Hyperactiviteit
- Vaak slapeloosheid

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is zeer **individueel en persoonlijk!**
Veel hangt af van de soort en hoeveelheid chemotherapie die u krijgt. **Iedereen reageert anders** op de toediening.

!

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen hebben er minder last van. De bijwerkingen verdwijnen meestal na de behandeling. Belangrijk hierbij is dat de ernst van de bijwerkingen **niets** te maken heeft met het resultaat van de behandeling!

Het is belangrijk dat u steeds uw bijwerkingen vermeldt aan uw arts of verpleegkundige bij een volgend ziekenhuisbezoek. Op die manier kunnen er mogelijkheden gezocht worden om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.
