



Dagziekenhuis Medische oncologie

Ingang 50, route 612

T +32 (0)9 332 31 68

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

CISPLATINUM

WEKELIJKSE TOEDIENING
IN COMBINATIE MET
RADIOThERAPIE

www.uzgent.be

Volg ons op



CISPLATINUM

U krijgt een gecombineerde behandeling van radiotherapie en chemotherapie.

De toediening van de chemotherapie duurt telkens een volledige dag.

Antibraakmiddel

Om misselijkheid en/of braken te verminderen krijgt u bij de start van uw behandeling altijd een antibraakmiddel.

Infuus spoelen

Tussen de toediening van elk product en op het einde van uw behandeling wordt het infuus kort met fysiologisch water gespoeld.

Extra vocht

Uw behandeling start met de toediening van 1 liter fysiologische zoutoplossing waaraan extra elektrolyten (kalium, chloor en magnesium) toegevoegd werden.

De toediening duurt 2 uur.

Het cytostaticum Cisplatinum kan de nieren schaden, daarom krijgt u veel vocht via de aders toegediend. Daarnaast is het ook raadzaam om veel te drinken. Zo worden uw nieren extra gestimuleerd. Door vaak te plassen, kan eventuele nierbeschadiging tot een minimum beperkt worden.

Cisplatinum

Cisplatinum is een cytostaticum. Het product is kleurloos en werd opgelost in een infuuszakje van 500 ml fysiologische zoutoplossing. De toediening duurt een uur.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapiebehandeling zoals vermoeidheid, braken en misselijkheid kan dit product een aantal andere ongemakken veroorzaken:

- ▲ **Verminderde werking van de nieren** is een van de belangrijkste nevenwerkingen. Bij elke bloedafname controleren we uw nierfunctietesten. Deze bloedwaarden geven de arts een duidelijk beeld van het functioneren van uw nieren. Op basis daarvan kan hij beslissen of de dosis van het cytostaticum eventueel aangepast moet worden.
- ▲ Een **vermindering van het gehoor voor hoge tonen of oorsuizen** komen ook vrij regelmatig voor. Het vermogen om een normaal gesprek te horen is soms gestoord. Spreek met uw behandelende arts als u er last van hebt.
- ▲ Een **daling van het aantal witte bloedcellen** is ook een nevenwerking die vrij regelmatig voorkomt. U kunt hier zelf niets tegen doen. We raden u wel aan om op te letten voor infecties. Controleer daarom regelmatig uw temperatuur. Verwittig uw arts bij koorts van 38,5°C of hoger.

Extra vocht

Na de toediening van de chemotherapie, krijgt u opnieuw 1 liter fysiologische zoutoplossing toegediend. Dat duurt 2 uur. We dienen dit extra vocht toe om uw nieren te stimuleren en beschermen.

Mannitol

Dit product heeft een vochtafdrijvende werking. Het is kleurloos.

U krijgt de helft van het infuuszakje van 500 ml toegediend. Dat duurt een halfuur.

Het product geeft geen bijwerkingen.