

## Vaccinaties

U mag niet alle vaccinaties krijgen tijdens het gebruik van deze medicatie. Overleg daarom altijd met uw specialist als u een vaccinatie nodig hebt. De griepvaccinatie is veilig en wordt ook aangeraden door uw specialist.

## Meer informatie

Bewaar uw medicijnen altijd waar kinderen er niet bij kunnen.

Contacteer uw huisarts of uw behandelend neuroloog (09 332 45 29) bij vragen of bij neveneffecten/klachten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijsluiter. U vindt ook onafhankelijke informatie over geneesmiddelen op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie: [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be).

v.l.: Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 050076 – Oktober 2019 – versie 1

## Dienst Neurologie

Ingang 12, route 1525  
T +32 (0)9 332 45 29  
[neurologie@uzgent.be](mailto:neurologie@uzgent.be)

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent  
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent  
T +32 (0)9 332 21 11 | E [info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)

[www.uzgent.be](http://www.uzgent.be)

Volg ons op



## INFO VOOR PATIËNTEN



# CYCLOFOSFAMIDE

(ENDOXAN®)



# CYCLOFOSFAMIDE (ENDOXAN®)

Uw neuroloog heeft u cyclofosfamide (Endoxan®) voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft algemene informatie over cyclofosfamide en vervangt de bijsluiter niet.

## Wat is cyclofosfamide?

Cyclofosfamide kan in tabletvorm voorgeschreven worden of via een infuus toegediend worden. Het geneesmiddel remt de celdeling (cytostaticum) en onderdrukt de natuurlijke afweer van het lichaam. Als cytostaticum leidt cyclofosfamide tot de groeiremming en dood van woekerende cellen. Cytostatica worden, vooral in hogere doseringen, gebruikt bij de behandeling van kanker. Bij auto-immune neurologische aandoeningen wordt deze behandeling ook gegeven. Het geneesmiddel onderdrukt de ontstekingen als gevolg van de ziekte, wat het genezingsproces bevordert. Het kan acht tot twaalf weken duren voor het effect merkbaar wordt.

## Combinatie met andere geneesmiddelen

U kunt cyclofosfamide gebruiken in combinatie met bijna alle geneesmiddelen. Enkele geneesmiddelen beïnvloeden echter de werking van cyclofosfamide. Vertel uw huisarts en specialist altijd welke geneesmiddelen u gebruikt en vraag advies bij nieuwe medicatie.

## Hoe innemen?

### Tabletten

Cyclofosfamide is een geneesmiddel in de vorm van comprimés van 50 mg. De voorgeschreven hoeveelheid is bere-

kend op uw lichaamsgewicht. Neem Cyclofosfamide één keer per dag in, liefst 's ochtends met een groot glas water, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd. Slik de comprimés in hun geheel door, dus niet kauwen of fijn malen.

### Per infuus

De toediening verloopt met de nodige vochttoediening en middelen om uw blaas en maag te beschermen. U moet dus in het ziekenhuis overnachten. Meestal bestaat een behandeling in zesmaandelijks toedieningen. Daarna wordt de behandeling, in functie van de noodzaak, minder frequent verdergezet of stopgezet.

## Mogelijke bijwerkingen

### Op korte termijn

Binnen enkele uren na de toediening van cyclofosfamide kunt u last krijgen van misselijkheid, braken en verminderde eetlust. Om die bijwerkingen te voorkomen, krijgt u tijdens het toedienen van de infusen medicijnen die de misselijkheid tegengaan.

### Op langere termijn

- ▲ Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
- ▲ Haaruitval (wanneer u stopt met de medicatie groeit het haar weer aan).
- ▲ Donkere verkleuring van de huid en nagels.
- ▲ Blaasontsteking (soms met bloed bij de urine).
- ▲ Vermindering of uitblijven van de menstruatie (is meestal van voorbijgaande aard).
- ▲ Makkelijk blauwe plekken, bloedneuzen, tandvleesbloedingen hebben.
- ▲ Verhoogd risico op blaaskanker: dat is weinig waarschijnlijk met kortdurende laaggedoseerde toediening. Uit voorzorg kan er best een jaarlijkse urinecontrole of urologisch advies zijn.
- ▲ Verhoogd risico op beenmergkanker: ook zeer onwaarschijnlijk bij lage dosis en tijdelijke toediening.
- ▲ Zeldzaam leverfunctiestoornis.

## Neem onmiddellijk contact op met uw specialist of huisarts bij:

- ▲ Infectietekens zoals koorts, rillingen, hoesten ...
- ▲ Herhaaldelijke bloedneuzen
- ▲ Snel blauwe plekken krijgen

## Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken en de precieze dosis te bepalen moet er altijd een bloedafname gebeuren bij opname en twee weken nadien. De huisarts kan daarvoor zorgen. Breng zeker het resultaat van de bloedafname van twee weken na de toediening mee naar uw volgende behandeling. Ook de urine moet gecontroleerd worden bij opname om een infectie uit te sluiten.

Bloedcontroles wanneer u pillen inneemt:

- ▲ wekelijks gedurende 4 weken
- ▲ tweewekelijks gedurende 8 weken
- ▲ daarna maandelijks

## Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Cyclofosfamide kan de zaad- en eicelproductie beïnvloeden en soms leiden tot blijvende onvruchtbaarheid. We adviseren zowel mannen als vrouwen om tijdens de behandeling voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen en die, na beëindiging van de medicatie, nog minimaal drie maanden voort te zetten.

Gebruik cyclofosfamide niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding.