

ERLOTINIB

KANKERCENTRUM



INHOUDSOPGAVE

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	5
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	6

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Erlotinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Erlotinib remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een bepaalde stof in sommige kankercellen.

Erlotinib is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam:

02 INNAME

De gebruikelijke dosering is éénmaal per dag 150 mg. Slik de tablet in zijn geheel door met water. Kies een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis. Neem de tablet in op een **lege maag**: minstens 1 uur voor het eten of 2 uur erna. Dan neemt het lichaam het geneesmiddel het beste op.

Gebruik geen geneesmiddelen om het zuurgehalte van uw maag te verminderen tijdens de behandeling met erlotinib. Indien het gebruik ervan toch onvermijdelijk is, probeer dan zoveel mogelijk tijd te laten tussen de verschillende inname momenten:

- antacida (Rennie®, Gaviscon®, Riopan®, Syngel®,...): minstens 4 uur vóór of 2 uur na de inname van erlotinib
- ranitidine (Zantac®, Ranitidine®,...): minstens 10 uur vóór of 2 uur na de inname van erlotinib
- protonpompinhibitoren (Omeprazole®, Losec®, Sedacid®, Pantoprazole®, Pantomed®,...): minstens 12 uur vóór of na de inname van erlotinib

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om de dosis (tijdelijk) te verminderen of uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

03 PLETTEN / BREKEN

U mag de tablet niet breken, kauwen of pletten.

Bij slikproblemen: contacteer de ziekenhuisapotheek (voor advies: +32 9 332 32 41).

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met erlotinib start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van erlotinib verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Een medewerker van de ziekenhuisapothek belt u in de komende weken op om uw thuismedicatie te overlopen. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN

- Rookt u? Laat u begeleiden om te stoppen. Roken kan de werking van erlotinib verminderen.
- Vermijd blootstelling aan zon en UV-licht zonder bescherming. Het is raadzaam beschermende kleding en zonnebrandcrème te gebruiken wanneer u wordt blootgesteld aan de zon.
- Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 2 weken na de behandeling met erlotinib.
- Eet geen pomelmoes, drink geen pomelmoessap of gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid, look of kurkuma. Deze producten kunnen de werking van erlotinib nadelig beïnvloeden.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

Merkt u binnen 4 uur na het gebruikelijke tijdstip dat u de dosis vergeten bent, neem hem dan alsnog zo snel mogelijk in. Is er meer dan 4 uur verstreken, sla dan deze vergeten dosis over en neem de volgende dosis in op het geplande tijdstip. Slik nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Meld een niet-ingenomen dosis steeds bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- Huiduitslag, gevoeligheid aan zon en UV-licht
- Diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, weinig eetlust
- Vermoeidheid
- Hoesten

Telefoonnummer verpleegkundig consulent: +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Erlotinib moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Erlotinib wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 12.30u-16.30u
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.