

GEFITINIB

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE / INHOUD(SOPGAVE)

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	5

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Gefitinib wordt gebruikt bij de behandeling van longkanker. Gefitinib remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een bepaalde stof in sommige kankercellen.

Gefitinib is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam:.....

02 INNAME

Neem elke dag één tablet gefitinib in met een glas niet-bruisend water, met of zonder eten. Het is belangrijk om dit elke dag op hetzelfde tijdstip te doen. Was uw handen na het aanraken van de tabletten.

Gebruik geen geneesmiddelen om het zuurgehalte van uw maag te verminderen tijdens de behandeling met gefitinib. Indien het gebruik ervan toch onvermijdelijk is, probeer dan zoveel mogelijk tijd te laten tussen de verschillende innamemomenten:

- antacida of ranitidine (Rennie®, Gaviscon®, Riopan®, Syngel®, Zantac®, Ranitidine®,...):
minstens 6 uur vóór of na de inname van gefitinib;
- protonpompinhibitoren (Omeprazole®, Losec®, Sedacid®, Pantoprazole®, Pantomed®,...):
minstens 12 uur vóór of na de inname van gefitinib.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

03 PLETTEN / BREKEN

Slik de capsule altijd in zijn geheel door.

NIET op deze medicatie kauwen, NIET verpulveren en NIET in twee delen.

Indien u de medicatie niet kan inslikken mag u deze ook oplossen in niet-bruisend water, ga hiervoor als volgt te werk: Laat de tablet, zonder deze fijn te malen, in een half glas drinkwater vallen. Het glas dient af en toe geroerd te worden totdat de tablet is opgelost (dit kan 20 minuten duren). Drink het glas onmiddellijk leeg nadat het oplossen is voltooid (dat wil zeggen binnen 60 minuten).

Het glas dient gespoeld te worden met een half glas water en dit dient ook opgedronken te worden. Was uw handen na het aanraken van de tabletten.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met gefitinib start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen en natuurlijke producten u gebruikt. Sommige geneesmiddelen en natuurlijke producten kunnen de werking van gefitinib verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen.

Uw thuismedicatie zal bevraagd worden door een medewerker van de ziekenhuisapotheek, eventueel telefonisch. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

- Eet geen pompelmoes, drink geen pompelmoessap of gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid, look of kurkuma. Deze producten kunnen de werking van gefitinib nadelig beïnvloeden.
- Neem dit geneesmiddel niet als u lactose-intolerant bent.
- Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 6 maanden na de behandeling met gefitinib.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

- Wanneer u een dosis gefitinib bent vergeten, neemt u de gemiste dosis het best zo snel mogelijk in, tenzij het minder dan 12 uur is tot de volgende dosis.
Met andere woorden: als u zich de vergeten dosis pas herinnert wanneer u minder dan 12 uur later alweer een nieuwe dosis moet innemen, dan haalt u de vergeten dosis NIET in.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Meld een niet-ingegenomen dosis steeds bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- Diarree
- Huidreacties
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken

Telefoonnummer verpleegkundig consulent: +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Gefitinib moet bewaard worden in de originele verpakking op kamertemperatuur. Bewaar gefitinib op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Gefitinib wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 13u-16u30
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Notities

This image shows a full page of white paper designed for handwriting practice. It features 18 evenly spaced horizontal dotted lines running from left to right across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.