

INFLIXIMAB

Uw neuroloog heeft u infliximab voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft algemene informatie over infliximab en vervangt de bijsluiter niet.

Wat is infliximab?

Infliximab behoort tot de zogenaamde TNF-alfa blokkerende middelen. Het remt ontstekingen af. Dat kan een gunstig effect hebben bij ontstekingsziekten van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld bij sarcoïdose of de ziekte van Behcet.

Combinatie met andere geneesmiddelen

U kunt infliximab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel uw huisarts en specialist altijd welke geneesmiddelen u gebruikt en vraag advies bij nieuwe medicatie.

Toediening

Infliximab wordt per infuus in het ziekenhuis gegeven. De eerste zes weken krijgt u drie infusen met infliximab. Daarna wordt infliximab eenmaal per zes of acht weken toegediend.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van infliximab die ooit zijn voorgekomen.

- ▲ Allergische (infuus)reacties: rillingen, koorts, jeuk, huiduitslag, hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid en pijn op de borst.

- ▲ Infecties: voor infliximab zijn frequent, meestal milde, virale bovenste luchtweginfecties vermeld. De TNF-blokkerende medicijnen mogen niet gegeven worden bij infecties en de toediening moet worden gestopt wanneer er een ernstige infectie optreedt. Omdat de TNF-blokkerende medicijnen uw afweer tegen infecties verminderen moet u bij infecties en/of hoge koorts onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts of neuroloog. Indien de klachten na behandeling door de huisarts niet verdwijnen, neemt u contact op met uw neuroloog.
- ▲ Overige bijwerkingen: leverfunctiestoornissen en stoornissen in de bloedaanmaak.
- ▲ Zeldzaam komt er ontsteking van de hersenen of zenuwen voor.
- ▲ Mogelijk bemoeilijkt infliximab de wondheling na een operatie. Stop dus – na overleg – met de behandeling minstens een maand voor een ingreep.

Contacteer uw neuroloog als u veel last hebt van bijwerkingen. Bel onmiddellijk uw arts bij hoge koorts.

Controles

Voor de opstart en voor elke toediening gebeurt een bloedafname om onderliggende infecties en lever- of bloedvormingsstoornissen op te sporen. Tuberculose moet uitgesloten worden voor de start.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Infliximab heeft zeer waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Er is nog weinig bekend over de invloed op de zwangerschap. Daarom gebruiken vrouwen bij een zwangerschapwens en zwangerschap beter geen infliximab. Vrouwen moeten zes

maanden ervoor stoppen met de medicatie, in overleg met de neuroloog. Gebruik infliximab niet tijdens de borstvoeding.

Vaccinaties

U mag niet alle vaccins krijgen tijdens het gebruik van deze medicatie. Overleg daarom altijd met uw specialist als u een vaccinatie nodig hebt. De griepvaccinatie is veilig en wordt ook aangeraden door uw specialist.

Meer informatie

Contacteer uw huisarts of uw behandelend neuroloog (09 332 45 29) bij bijkomende vragen of bij neveneffecten/klachten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijsluiter. U vindt ook onafhankelijke informatie over geneesmiddelen op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie: www.bcfi.be.