

Meer informatie

- ▲ Bewaar uw medicijnen altijd waar kinderen er niet bij kunnen.
- ▲ Wees voorzichtig met alcohol.
- ▲ Beperk blootstelling aan de zon en gebruik zonnecrème.

Contacteer uw huisarts of uw behandelend neuroloog (09 332 45 29) bij vragen of bij neveneffecten/klachten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijsluiter. U vindt ook onafhankelijke informatie over geneesmiddelen op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be.

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 050077 – Oktober 2019 – versie 1

Dienst Neurologie

Ingang 12, route 1525
T +32 (0)9 332 45 29
neurologie@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



METHOTREXAAT

(LEDERTREXATE®)



METHOTREXAAT (LEDERTREXATE®)

Uw neuroloog heeft u methotrexaat voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft algemene informatie over methotrexaat en vervangt de bijsluiter niet.

Wat is methotrexaat?

Methotrexaat is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 2,5 mg. Methotrexaat wordt voorgeschreven bij de behandeling van auto-immune (neurologische) aandoeningen. Het geneesmiddel brengt het ontstekingsproces in het zenuwstelsel tot rust. Het kan twee tot vier maanden duren voor u merkt dat het begint te werken. Indien methotrexaat een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Het is daarbij belangrijk dat u het middel blijft innemen zoals de arts het voorschrijft, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert.

Combinatie met andere geneesmiddelen

U kunt methotrexaat in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Enkele geneesmiddelen beïnvloeden echter de werking van methotrexaat. Gebruik het bijvoorbeeld niet samen met bepaalde antibiotica zoals penicilline of co-trimoxazol. Vertel uw huisarts en specialist altijd welke geneesmiddelen u gebruikt en vraag advies bij nieuwe medicatie.

Hoe innemen

Methotrexaat neemt u één keer per week in. Uw neuroloog vertelt u hoeveel tabletten u per keer moet innemen. U mag geen melk drinken voor of tijdens de medicatie-inname. Als u in de loop van de dag ontdekt dat u de

tabletten vergeten bent in te nemen, neem die dan nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag. Ontdekt u het pas later in de week, sla dan uw tabletten voor die week over. Op de gebruikelijke innamedag van de daaropvolgende week neemt u weer de normale hoeveelheid tabletten in.

Methotrexaat werkt in op de aanmaak van foliumzuur in lichaamscellen. Daarom wordt bij de methotrexaat ook foliumzuur voorgeschreven. Neem dat niet op dezelfde dag als de Methotrexaat in, maar 24 uur erna.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van methotrexaat vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De meest voorkomende zijn:

- ▲ Maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en braken of diarree
- ▲ Hoofdpijn
- ▲ Iets grotere vatbaarheid voor infecties zoals griep, bronchitis, long- en blaasontsteking
- ▲ Ontsteking van de longen (pneumonitis)
- ▲ Aftjes en zweren in de mond

Neem onmiddellijk contact op met uw neuroloog of huisarts bij:

- ▲ Herhaaldelijke bloedneuzen
- ▲ Het snel ontstaan van blauwe plekken
- ▲ Koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van uw huid of ogen
- ▲ Hevige buikpijn
- ▲ Hoge koorts, zeker met kortademigheid

Hebt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw neuroloog.

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever of de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist regelmatig uw bloed onderzoeken:

- ▲ wekelijks gedurende 4 weken
- ▲ tweewekelijks gedurende 8 weken
- ▲ dan maandelijks

Die bloednames kunnen bij de huisarts gebeuren. U contacteert de huisarts de dag erna voor het resultaat. Vraag om een kopie te sturen naar uw behandelend neuroloog.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Methotrexaat verhoogt het risico op een miskraam en op geboortefwijkingen. Overleg steeds een eventuele zwangerschapsplanning met uw neuroloog. Vermijd borstvoeding bij de inname van Methotrexaat.

Vaccinaties

U mag niet alle vaccinaties krijgen tijdens het gebruik van deze medicatie. Overleg daarom altijd met uw specialist als u een vaccinatie nodig hebt. De grieprik is veilig en wordt ook aangeraden door uw specialist.