

## Meer informatie

- ▲ Bewaar uw medicijnen altijd waar kinderen er niet bij kunnen.
- ▲ Wees voorzichtig met alcohol.
- ▲ Beperk blootstelling aan de zon en gebruik zonne crème.

Contacteer uw huisarts of uw behandelend neuroloog (09 332 45 29) bij vragen of bij neveneffecten/klachten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijsluiter. U vindt ook onafhankelijke informatie over geneesmiddelen op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be).

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirtio Print – 050078 – Oktober 2019 – versie 1

## Dienst Neurologie

Ingang 12, route 1525  
T +32 (0)9 332 45 29  
[neurologie@uzgent.be](mailto:neurologie@uzgent.be)

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent  
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent  
T +32 (0)9 332 21 11 | E [info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)

[www.uzgent.be](http://www.uzgent.be)

Volg ons op



## INFO VOOR PATIËNTEN



# MYCOFENOLAAT MOFETIL

(CELLCEPT®)



# MYCOFENOLAAT MOFETIL (CELLCEPT®)

Uw neuroloog heeft u mycofenolaat mofetil voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft algemene informatie over mycofenolaat mofetil en vervangt de bijsluiter niet.

## Wat is mycofenolaat mofetil?

Mycofenolaat mofetil is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 250 of 500 mg. Mycofenolaat mofetil wordt voorgeschreven bij de behandeling van auto-immune (neurologische) aandoeningen. Het medicijn brengt het ontstekingsproces in het zenuwstelsel tot rust. Het kan één tot drie maanden duren voor u merkt dat het medicijn begint te werken.

Indien mycofenolaat mofetil een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Het is daarbij belangrijk dat u het middel blijft innemen zoals de arts heeft voorgeschreven, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert.

## Combinatie met andere geneesmiddelen

U kunt mycofenolaat mofetil in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Enkele geneesmiddelen beïnvloeden echter de werking van mycofenolaat mofetil, o.a. maagzuurremmers (waaronder omeprazol), colestyramine, aciclovir, gangiciclovir, valaciclovir, ciclosporine, azathioprine en rifampicine. Vertel uw huisarts en specialist altijd welke geneesmiddelen u gebruikt en vraag advies bij nieuwe medicatie.

## Hoe innemen

Neem de tabletten voor de maaltijd in, elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip, gespreid over 2 of 3 innames. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar volledig doorslikt.

## Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van mycofenolaat mofetil die ooit zijn voorgekomen.

### De meest voorkomende zijn:

- ▲ Maag- en darmklachten, zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree.
- ▲ Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
- ▲ Erge keelpijn in combinatie met koorts, bloedneuzen en blauwe plekken (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).

### In sommige gevallen:

- ▲ Stoornissen in de werking van de lever. U merkt daar niets van, het kan aangetoond worden bij een bloedonderzoek.
- ▲ Hoge bloeddruk.

### Neem onmiddellijk contact op met uw specialist of huisarts bij:

- ▲ Hoge koorts
- ▲ Herhaaldelijke bloedneuzen
- ▲ Snel blauwe plekken krijgen
- ▲ Koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van uw huid of ogen

Hebt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw neuroloog.

## Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever of de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist regelmatig uw bloed onderzoeken:

- ▲ wekelijks gedurende 4 weken
- ▲ tweewekelijks gedurende 8 weken
- ▲ dan maandelijks om de 4 maanden
- ▲ driemaandelijks bij een stabiele dosis gedurende een tijdje

De bloedname kan bij de huisarts gebeuren. U contacteert de huisarts de dag erna voor het resultaat. Vraag om een kopie te sturen naar uw behandelend neuroloog.

## Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Mycofenolaat mofetil kan schadelijk zijn voor de foetus. Bespreek een zwangerschapswens altijd met uw behandelende neuroloog. Vermijd borstvoeding tijdens de behandeling met mycofenolaat mofetil.

## Vaccinaties

U mag niet alle vaccinaties krijgen tijdens het gebruik van deze medicatie. Overleg daarom altijd met uw specialist als u een vaccinatie nodig hebt. De grieprik is veilig en wordt ook aangeraden door uw specialist.