

OSIMERTINIB (TAGRISSO®)

KANKERCENTRUM



INHOUDSOPGAVE

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	5

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Tagrisso® is een geneesmiddel voor het behandelen van een bepaalde vorm van longkanker, namelijk lokaal gevorderde of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Tagrisso® remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een specifieke stof in sommige kankercellen.

Tagrisso® bevat de werkzame stof osimertinib.



02 INNAME

Neem elke dag één tablet Tagrisso® van 80mg in zijn geheel in met een glas water, met of zonder eten. Het is belangrijk om dit elke dag op hetzelfde tijdstip te doen. Indien nodig kan uw arts de dosering verlagen naar elke dag één tablet van 40mg.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

03 PLETTEN / BREKEN

Slik de tablet altijd in zijn geheel door.

U mag de tablet NIET breken, NIET kauwen of NIET pletten.

Als het u moeite kost om de tablet door te slikken, dan kunt u deze oplossen in water:

- Doe de tablet in een glas zonder deze eerst te verpulveren.
- Voeg 50 ml (ongeveer twee derde van een waterglas) niet-bruisend water toe. Gebruik geen andere vloeistoffen.
- Roer tot de tablet in zeer kleine stukjes uiteen is gevallen – de tablet lost niet volledig op.
- Drink de oplossing meteen op.
- Spoel het glas goed met opnieuw 50 ml water en drink dit op, zodat u er zeker van kunt zijn dat u ook alle resten van het geneesmiddel heeft ingenomen.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met Tagrisso® start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Tagrisso® verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Uw thuismedicatie zal bevestigd worden door een medewerker van de ziekenhuisapothek, eventueel telefonisch. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid, dit kan de werking van Tagrisso® nadelig beïnvloeden.
- Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 4 maanden na de behandeling met Tagrisso®. Overleg met uw arts wat de meest geschikte methode van anticonceptie is.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

- Wanneer u een dosis Tagrisso® bent vergeten, neemt u de gemiste dosis het best zo snel mogelijk in, tenzij het minder dan 12 uur is tot de volgende dosis.
Met andere woorden: als u zich de vergeten dosis pas herinnert wanneer u minder dan 12 uur later alweer een nieuwe dosis moet innemen, dan haalt u de vergeten dosis NIET in.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Meld een niet-ingenomen dosis steeds bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

Neem onmiddellijk contact op met de arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt:

- Plotseling moeite met ademen, in combinatie met hoesten of koorts
- Waterige ogen, gevoeligheid voor licht, oogpijn, roodheid van de ogen of veranderingen in uw gezichtsvermogen

Overige vaak voorkomende bijwerkingen:

- Diarree
- Huiduitslag, jeuk, nagelproblemen
- Ontsteking van het mondslijmvlies

Telefoonnummer verpleegkundig consulent: +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Tagrisso® moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapothek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Tagrisso® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 13u-16u30
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.